


Path.

1163

ki



Path.

Schulz

1163 Ki

DIAGNOSTIK
der
HAUTKRANKHEITEN

in
tabellarischer Ordnung

nach
Dr. HEBRA'S

Vorlesungen.

Von
Dr. Benedict Schulz.

Wien, 1845.

Kaulfuss Witwe, Prandel & Comp.

WILHELM
VON

HAUTKRAUKHEITEN

Abelharischer Ordnung

Dr. HERBES



Wien 1842
Karlhaus Witten, Prandel & Comp.
Karlhaus Witten, Prandel & Comp.

Seiner Excellenz

dem

Hochwürdigsten und Hochgebornen

Herrn

JOHANN LADISLAUS PYRKER

von Felső-Eör,

Patriarch-Erzbischof von Erlau, Ritter des österr. kaiserl. Ordens der eiser-
nen Krone erster Klasse, k. k. wirkl. geheim. Rath; Erb-Obergespann der
vereinigten Heveser und äusseren Szolnoker Gespannschaften; Ehrenmitglied
der ungar. Akademie der Wissenschaften und der lateinischen Societät zu
Genua; Doctor der Theologie an der Universität zu Würzburg; Ehrenmit-
glied der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien, der k. Akademie
der Wissenschaften zu München, der k. k. Akademie der Wissenschaften zu
Padua, der k. k. landwirthschaftl. Gesellschaft in Wien; Ehrenmitglied der
mähr. schles. Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde;
dann Ehrenmitglied der k. k. landwirthschaftl. Gesellschaft in Krain, und
der Athenäen zu Venedig, Brescia und Treviso etc. etc.

seiner Excellenz

dem
mit der

Hochwürdigsten und Hochgebornen

tiefsten Verehrung

JOHANN LAIBLUS PYRKE

gewidmet vom

von Felsö-För,

Parlaments-Beisitzer von Felsö-För, Mitglied des österr. Reichsrathes, Ordens der eiser-
nen Krone erster Klasse, k. k. wirkl. geheim. Rath; Erb-Obergespann der
vereinigten Hezzer und äusseren Ständes Gespannschaften; Ehrenmitglied
der ungar. Akademie der Wissenschaften und der tschechischen Societät zu
Genua; Honorar-Professor an der Universität zu Würzburg; Ehrenmit-
glied der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien, der k. Akademie
der Wissenschaften zu München, der k. k. Akademie der Wissenschaften zu
Padua, der k. k. Landwirtschaftl. Gesellschaft in Wien; Ehrenmitglied der
österr. Gesellsch. der Natur- und Landeskunde; der k. k. Landwirtschaftl. Gesellsch. in Wien, und
der k. k. Landwirtschaftl. Gesellsch. in Triest etc. etc.

Verfasser.

Vorrede.

Ich wende mich mit einigen Zeilen an meine verehrte Collegen! nicht etwa der Alltags-Etiquette halber, jedes Geistesprodukt mit vorwörtlichem Kleide zu umhängen, sondern um mich zu verständigen über den Zweck dieser Schrift, die ich in Ihre freundliche Hände lege.

Vielfache Gewährsmänner haben zwar Tüchtiges geleistet auf dem dermatologischen Felde, doch haben Andere uns bereichert mit seltsamen Thatsachen, mit noch sonderlichern Nomenclaturen; sie mehrten die sonst unbegrenzte Wissenschaft mit Einzelheiten, die oft ältere falsche Ansichten zu bekräftigen und neue Verirrungen zu schaffen nicht versäumten. — Unsere Schule hat indess in der Neuzeit jedem Zweige des medizinischen Wissens die gebührende Aufmerksam-

VI

keit geschenkt, und so konnte auch das so wichtige Organ, die Haut, nicht übersehen werden. Herr Dr. Hebra hat, mit Benützung des von seinen Vorgängern in diesem Bereiche Erprobten, so Wesentliches zur Lehre der Hautkrankheiten beigetragen, dass nur der mit seinen Aussagen vollends Vertraute, ihm seiner Neuerungen halber — die freilich hundertjährigem Glauben und Traditionen, aber nicht Ueberzeugungen widersprechen — nicht nur sein errungenes Verdienst nicht schmälern, sondern der Wissenschaft und der Praxis wegen, ihm doppelten Dank wissen wird; denn wahrlich Wirren entwirrt und Dunkel erhellt zu haben, verdient ungeheuchelte Anerkennung.

Die genaue Kenntniss der Hautkrankheiten forderte eine genaue Symptomatologie, und Letztere wurde dadurch noch vollständiger, dass jedem Symptome und der Aufeinanderfolge der Einzelnen die gehörige Deutung beigegeben wurde, indem der pathologische Prozess, der die abnormen Erscheinungen entstehen lässt, vorzüglich berücksichtigt wurde. Allein wie in jedem wissenschaftlichen Fache, so bedürfen wir auch hier zum leichtern und übersichtlicheren Studium, eines methodisch Geordneten, einer logischen Klassification der einzelnen Krankheiten. Die Letztere wurde nun aus der Verschiedenheit der objectiven Erscheinungen entnommen, nicht als meinten wir, dass sie die richtig-

ste und am meisten naturgemässe wäre, sondern weil sie die zweckmässigste ist; denn die Symptome sind von der Natur hervorgebildet und können nicht abgeändert werden, und diese aufzufassen und mit einander zu verbinden, wird Jeder befähigt sein, der mit der gewöhnlichen Schärfe der Sinnesorgane und Verstandesvermögen begabt ist. Demnach behielten wir das Willan-Biett'sche System bei, und die folgenden Blätter werden die Differenzen lehren, die wir an demselben vorgenommen.

Dass die tabellarische Form am meisten eine vortheilhafte und klare Uebersicht des Ganzen gewährt, wird Niemand bestreiten, und der Anfänger sowohl als der Geübtere findet auf diese Weise das beste Leitband, in jedem gegebenen Falle nicht nur die Benennung, sondern auch das Wesen der Krankheit mit Sicherheit ausmitteln zu können. Einer guten Diagnose geht eine richtige Behandlung — wenn sie die Natur der Krankheit überhaupt möglich macht, — stets zur Seite. Was jedoch die Therapie betrifft, so wollte ich dieser Zeit nicht vorgreifen, in der Herr Dr. Hebra selbst seine gelungenen Resultate veröffentlichen wird, doch kann ich versichern, dass sie keinem Systeme vorzugsweise huldigt, sondern von Jedem das Nützliche und Gute auswählt und vernünftig anwendet. — Die dermatologische Diagnose zu erleichtern, ist somit der

VIII

Hauptzweck dieser Arbeit, und ich hoffe insbesondere denjenigen meiner Herrn Collegen, die die Vorlesungen des Herrn Dr. Hebra schon gehört und noch hören werden, einen nicht unangenehmen Dienst geleistet zu haben.

Der Verfasser.

Einleitung.

Die Hautkrankheiten treten unter mannigfachen Formen auf. Die Form ist jedoch nicht ein Zufälliges, sondern etwas Bestimmtes und durch den jeweiligen pathologischen Prozess in der Haut Bedingtes. Die Form kennzeichnet somit die Krankheit selbst. Nur durch die detaillierte Würdigung der Ersteren werden wir die Letztere erkennen. Nun behält aber eine Hautkrankheit während ihres Verlaufes nicht dieselben äusserlichen Merkmale bei, mit denen sie begonnen, sondern ändert dieselben nach gewissen unabänderlichen Gesetzen, demnach müssen wir insbesondere diejenigen Formen kennen, die die Hauteruptionen bei ihrem Erstauftreten zeigen, und nennen sie primäre Efflorescenzen zum Unterschiede der secundären, die sich aus den Ersteren entwickeln.

Zu den Primär-Efflorescenzen zählen wir:

1) Macula (ein Fleck) bedeutet eine einfache umschriebene Farbenveränderung der Haut, ohne wahrnehmbare Texturumwandlung.

Es ist zwar nicht denkbar, dass an der Umänderung der Farbe eines Hauttheiles nicht auch dessen Textur Theil nehme, allein zur Charakteristik eines Fleckes gehört es, dass die Gewebismetamorphose nicht auffallend sei.

Die Farbenveränderung ist begränzt, ohne damit die Ausdehnung auf irgend eine Weise bestimmen zu wollen.

Die normale Färbung kann in die weisse, rothe, braune übergehen, die Ursache liegt im Blute, oder im Pigmente (in dessen Mangel oder Zunahme,)

- 2) Stigma** (eine Stippe) ist ein rother, durch Gefässinjection bedingter, runder Fleck, in dessen Mitte eine kleine Erhöhung bemerkbar ist.

Diese Erhöhung ist somit von einem rothen Hofe umgeben.

- 3) Papula** (ein Knötchen) nennt man jene hirsekorn- bis linsengrosse Erhöhung der Haut, die keinen Hof hat, fest ist oder ein wasserhelles Fluidum enthält, das aber erst mit der Zerstörung des Knötchens sichtbar wird.

Die Bildung eines Knötchens wird bedingt durch Exsudat- ablagerung in den Follikel, und unterscheidet sich von der Stippe durch seine Grösse, und durch den Mangel eines Hofes, da die Papula gleichsam durch Vergrösserung der Stippe auf Kosten des Hofes zu Stande kommt.

Der Inhalt des Knötchens ist meistens fest, wenn er jedoch flüssig ist, darf er als solcher während des Bestehens der Papula nicht erkannt werden (vide: Bläschen).

- 4) Tuberculum** (ein Knoten) nennt man diejenige Erhöhung an der Haut, die die Grösse einer Erbse bis Haselnuss erreicht, und welcher die übrigen genannten Eigenschaften des Knötchens zukommen. —

Der Knoten ist demnach nur ein grösseres Knötchen.

5) Phyma (Knollen) nennt man einen Knoten der von der Grösse einer Haselnuss bis zu der eines Taubeneies anwächst.

Knötchen, Knoten und Knollen sind demnach nur nach ihrer Grösse unterschieden.

6) Urtica (eine Quaddel) nennt man jene über das Niveau der Haut hinausreichende Erhebung, die an ihrer Höhe eine ebene (und keine spitzige) Ausdehnung hat.

Quaddeln stellen Cylinderabschnitte dar, die nur wenig über das Hautniveau hervorragen.

7) Vesicula (ein Bläschen) heisst man eine umschriebene, erbsen- bis linsengrosse, durch ein sichtbar durchscheinendes Fluidum bedingte Erhöhung der Epidermis, die zugleich mit ihrem grössten Durchmesser aufsitzt.

Das Bläschen hat einen wasserhellen Inhalt, der noch während des Bestehens der Efflorescenz bemerkbar wird, unterscheidet sich somit von denjenigen Knötchen, die erst, nachdem sie zerstört wurden, ein flüssiges Contentum entleeren.

Die Vesicula wird durch ein seröses Exsudat in dem Follikel hervorgerufen, und kann als ein mit sichtbar wasserheller Flüssigkeit gefülltes Knötchen vorgestellt werden. — Seröses Exsudat ausserhalb des Follikels bedingt Oedem der Haut.

Wenn viele nebeneinander stehende Bläschen, in Folge schnell wiederholter Exsudatbildung confluiren, ohne zu zerreißen, so wird die Epidermis der gesammten Bläschen von der darunter angesammelten Flüssigkeit emporgehoben, die dann so

viel Einkerbungen an ihrer Oberfläche zeigt, als Bläschen vorhanden waren.

8) Bulla (eine Blase), bedeutet eine Erhöhung der Epidermis, die durch den Erguss eines wasserhellen Fluidums bedingt, die Grösse einer Erbse übersteigt, und mit ihrem grössten Durchmesser nicht aufsitzt.

9) Pustula (eine Pustel) nennt man im Allgemeinen eine mit einer gelben Flüssigkeit (Eiter) gefüllte Erhöhung der Epidermis.

Diese Efflorescenz entwickelt sich entweder aus Andern, wie z. B. aus der Stippe, dem Knötchen, dem Knoten, dem Knollen, dem Bläschen in Folge eiterigen Schmelzens der exsudirten Masse, die die genannten Formen entstehen liess; diese Pustel heisst eine secundäre, oder sie entsteht als primäre Efflorescenz, ohne sich aus einer andern herauszubilden.

Als primäre Pusteln haben sie eine eigene Gestaltung, die sie leicht von den Secundären unterscheiden macht, da sie dann unter drei Formen auftreten:

a) als **Achores**. Diese sind kleine, runde, wenig oder gar nicht über das Niveau der Haut hervorragende, deutlich von einem Haare (oder Lanugo) durchbohrte Pusteln, die zu einer granulirten honiggelben Borke vertrocknen.

Sie sind klein, da sie die Grösse eines Bläschens haben und die kleinste Form der Pusteln darstellen.

Sie sind rund, da sie durch ein in den Follikel abgesetztes eiteriges Exsudat erzeugt werden.

Das Durchbohrtsein von einem Haare erkennt man an der Depression in ihrer Mitte, und entsteht dadurch, dass das eiterige Exsudat in einem Haarfollikel Statt findet.

Sie ragen über das Haut-Niveau wenig hervor, weil sie in der Cutis sitzen, und sind unmittelbar unter der Epidermis wahrzunehmen.

Das granulirte Aussehen der Borke kömmt dadurch zu Stande dass das eitrige Fluidum des Follikels bei seinem Austritte an die Oberfläche bald vertrocknet und eine kleine Erhöhung bildet; da aber an den zwischen den Follikeln gelagerten Stellen keine eitrige Ausschwitzung Statt findet, so entsteht an diesen Punkten eine Vertiefung und die Borke erhält ein höckeriges Ansehen.

Honiggelb ist die Borke, weil der Inhalt aus Eiter und Sebum besteht, die, wenn sie vertrocknen, gelb gefärbt werden.

b) **Psydrasion** stellt eine grössere, nicht runde, mit reinem Eiter gefüllte und von einem Hofe umgebene Pustel dar, deren Inhalt zu einer grünen Borke vertrocknet, die nach ihrem Abfallen eine kleine weisse Narbe zurücklässt.

Sie ist nicht rund, weil der Entzündungs-Prozess nicht nur in dem Follikel, sondern auch in dessen Umgebung sitzt, und aus eben dem stärkeren Congestionsgrade hat sie einen Hof. Grün gefärbt ist die Borke, weil sie in Folge Vertrocknung reinen Eiters entsteht.

c) **Phlyzakion**, stellt eine runde mit eiterigem und blutigem Inhalte gefüllte Blase dar, die zu

XIV

einer braunen Borke vertrocknet. (Hat meistens einen Halo). Braun gefärbt ist die Borke in Folge der Vertrocknung des aus Eiter und Blut bestehenden Pustel-inhaltes.

Zu den secundären Efflorescenzen gehören:

1) Squamae (Schuppen), sie stellen abgestorbene Epidermis, in dicken und dünnen Schichten dar.

Die Farbe derselben wird bedingt 1) von dem Dicke-Grade, denn je dicker desto dunkler, und je dünner desto lichter erscheinen sie; 2) von der Pigmentmenge, die in dem Plasma enthalten ist, woraus die Epidermis gebildet wird.

2) Crusta (eine Kruste, Borke) ist jedes vertrocknete Exsudat.

Crusta lamellosa (Schuppengrind) nennt man jene Borke die an ihrer Oberfläche eben und flach ist, da sie von Epidermis überzogen wird, denn sie entsteht durch Vertrocknung des Inhaltes der primären Efflorescenz, ohne dass die Epidermiskapsel der Letzteren vorher berstet.

Die genannten primären und secundären Efflorescenz-Formen befolgen in Beziehung ihrer Aneinanderreihung nicht immer dieselbe Ordnung, so dass die Beachtung der Aggregation der einzelnen Efflorescenzen von grosser Wichtigkeit ist.

Dieser zu Folge unterscheiden wir:

Effloresc. discretæ, disseminatæ, als solche, bei denen jede einzelne Efflorescenz während des ganzen Verlaufes von der andern getrennt bleibt.

Die Synonyma von dieser sind: *simplex*, *punctatus*, *guttatus*, *intertinctus*, *monocarpus*.

Efflor. confertae, bei welchen die einzelnen Efflorescenzen zusammenfliessen.

Die conferte Form kann primär auftreten, oder auch secundär durch Confluenz der früher Getrenntstehenden.

Kommt die conferte Form festen, trockenen Efflorescenzen zu, so sagt man sie sind: *conhaerent*; wenn sie aber solchen eigen ist, die mit flüssigem Inhalte gefüllt sind, so bezeichnet man sie: als *confluentes*.

In Beziehung der Ausdehnung, ist die Efflorescenz entweder auf einen kleinen Raum beschränkt, und genau abgegränzt: *circumscrip*t, oder über einen grösseren Hauttheil, z. B. über eine ganze Hand, über den ganzen Arm etc. ausgebreitet: *diffus*.

Zuweilen hat die *circumscrip*te Form eine solche Begränzung, dass sie irgend einem äusseren Gegenstande ähnlich sieht, und dann heisst die Eruption: *figurirt* (*figurata*) oder sie hat eine Münzform: *numularis* oder eine Schüsselform: *scutellata*.

Die Schüsselform entwickelt sich aus der Münzform, indem die Mitte der Letzteren (in Folge der Heilung) tiefer wird. — Wenn das Centrum einer Münzform eine ganz normal beschaffene Haut zeigt, so entsteht eine Form, die man als *annulata*, oder *centrifugal*is, oder *circinata* bezeichnet.

Serpiginös (*serpiginosus*), nennt man jene kreis- und bogenförmige Eruption, an deren concavem Rande man ein Heilen, an deren convexem ein Weiterschreiten der Krankheit beobachtet. Der Beiname

Gyratus, bedeutet die geschlängelte Form, und sie entwickelt sich primär oder auch secundär, durch das Aneinanderstossen einzelner Kreissegmente.

Corymbosus, ein gruppenweises Nebeneinanderstehen der Efflorescenzen.

Hat man sich nun die Begriffe der primären und secundären Efflorescenz-Formen eigen gemacht, so wird in einem gegebenen Falle mit nicht bedeutender Schwierigkeit ausgemittelt werden können, ob Schuppen, Knötchen, Bläschen etc. zur Beobachtung vorliegen, und bei der Systematisirung der Hautkrankheiten wird demnach als Eintheilungsgrund, die Form derselben, zum Behufe einer leichteren Erkennbarkeit, mit Vorthail angewendet werden.

Jeder Efflorescenz-Form entspricht eine Klasse, somit haben wir: maculöse, squamöse, papulöse, tuberculöse, vesiculöse, bullöse, pustulöse Haut-Eruptionen *). Nebstbei müssen wir vom praktischen Standpunkte aus berücksichtigen, ob diese genannten Formen sich als selbstständige Erkrankungen der Haut manifestiren, (was doch sehr häufig sich ergibt, und im Vergleich zu andern Organen nicht anders denkbar ist) oder ob sie als Symptome einer eigenthümlichen (acuten oder chronischen) Blutmischung (Dyscrasie) anzusehen sind. In Anbetracht der unlängbaren Bluterkrankung adjungiren wir den früheren: die exanthematischen und syphilitischen Hautleiden, und führen die einzelnen Klassen in folgender Reihe vor.

Erste Klasse: *Exanthemata*.

Zweite „ *Efflorescentiae maculosae*.

Dritte „ „ „ *squamosae*.

Vierte „ „ „ *papulosa*.

Fünfte „ „ „ *tuberculosa*.

Sechste „ „ „ *vesiculosae*.

Siebente „ „ „ *bullosae*.

Achte „ „ „ *pustulosa*.

Anhang. *Syphilides*.

*) Die Crustösen bilden aus diesem Grunde keine eigene Klasse, weil, wie wir wissen, sie vertrocknetes Exsudat darstellen, und ihnen somit Bläschen und Pusteln vorausgehen.



Erste Klasse.

Die Exantheme (*Exanthemata*).

Exantheme sind acute Exsudativprozesse, die durch eine Blutkrankheit bedingt, ihre Producte sowohl in die Haut als auch in innere Organe deponiren, einen febrilen und typischen Verlauf beobachten, und entweder jedesmal, oder nur zu gewissen Zeiten und an bestimmten Orten, ein Contagium entwickeln.

Die Blutkrasis kann eine verschiedenartige sein, und zwar ist das Blut phlegmonös (stark gerinnfähig), oder defibrinirt, oder endlich septisch. Diesen genannten Blutmischungen entspricht eine gewisse Farbe, die von hellroth, braunroth bis in's Schwärzliche variirt, und diese Blutfärbungen sind correspondirend den Hautexsudaten des Exanthems. Die Hautefflorescenz zeigt die Farbe des Blutes.

Die Exsudatbildung tritt mit den primären Formen auf, als Fleck, Knötchen, Quaddel etc.

Das Fieber wird als ein erethisches, phlegmonöses, putrides und nervöses geschildert. Allein der Fiebercharakter selbst wird von der entsprechenden Blutkrasis bestimmt, und denselben erkennt man wieder aus gewissen äussern Erscheinungen der Exanthemform.

Der Typus der Exantheme besteht darin, dass sie gewisse Zeiträume durchlaufen, und zwar:

1. Das *Stadium prodromorum*, das von dem Momente des Erkrankens bis zu dem der Eruption reicht. In dieser Zeit ist an der Haut noch gar nichts wahrzunehmen.
2. Das *Stadium eruptionis*, das mit dem Ausbruche des Exanthes beginnt, und so lange dauert, bis das dasselbe sich deutlich entwickelt hat. In dieser Zeit weiss man schon, dass eine Hautkrankheit im Entstehen begriffen ist, man kann sie jedoch nicht bestimmen, weil ihr die eigentliche Form abgeht.
3. Das *Stadium floritionis*, in welchem das Exanthem sich weiters entwickelt, und höchst ausgebildet wird.
4. Das *Stadium decrementi*, wo das Exanthem sich zurückbildet und entweder mit Desquamation oder Decrustation endigt.

Das Contagium, das entwickelt wird, ist entweder flüchtig allein, wie z. B. bei *Scarlatina*, oder flüchtig und fix, wie bei *Variola*.

Im Allgemeinen sind bei jedem Exantheme zu berücksichtigen die einzelnen Stadien, und in jedem derselben wieder die:

- a) Erscheinungen des Fiebers,
- b) Erscheinungen auf der Haut,
- c) begleitenden Symptome, (die auch ohne den exanthematischen Prozess bestehen können).

Die Eintheilung der Exantheme geschieht nach der Anwesenheit des Contagiums, welches letztere:

- a) entweder stets vorhanden ist, *Exanthemata proprie sic dicta*;
 b) nicht immer vorhanden ist, *Exanthemata relativa*, und zwar:
- α) nicht an jedem Orte,
 β) nicht zu jeder Zeit.

I. Exanthemata proprie sic dicta

sind:

A. Normal verlaufend.

	Stadium und Dauer desselben.	Fiebererscheinungen.	Erscheinungen an der Haut.	Begleitende Erscheinungen.
Morbilli (die Flecke, Masern).	I. Stadium, (<i>Prodromorum</i>) 2—3 Tage.	Plötzlich beginnend und abendliche Ex- acerbationen machend.	In diesem ist nichts als eine bren- nende Wärme an der Haut bemerk- bar (die eigenthümliche exanthema- tische Wärme, die sich nicht be- schreiben, sondern nur durch den Tastsinn aneignen lässt).	Katarrhalische: An- der Conjunctiva des Auges, an der Schleimhaut der Na- se und des Respirations- Tractes, daher sind Thrä- nen der Augen, das Gefühl von Sand zwischen den Au- genliedern, häufiges Nie- sen, trockener heftiger Hu- sten wahrzunehmen.
	II. Stadium, (<i>eruptionis</i>) dauert meistens 1 Tag.	Beginnt mei- stens während einer bedeuten- den Abendexa- cerbation.	Im Gesichte zuerst ent- stehen rothe getrennt stehende Flecke und zwar in dem Umkreise des Mundes, der Nasenöffnungen, und um die Augen.	Steigerung der katarrha- lischen Symptome des frü- hern Stadiums, so zwar, dass ein heftigerer Husten und ein stärkerer Ausfluss aus der Nase statt findet.

III. Stadium, (<i>floritionis</i>) dauert 4 — 6 Tage.	Das Fieber ist in d. ersten Ta- gen gesteigert. Mit dem Entfär- ben des Exan- thems (in den letzten Tagen) nimmt auch des- sen Intensität ab, bis es fast verschwindet.	Die rothen getrennt stehenden Flecke sind linsenförmig, halbmond- förmig, jeder einzelne von einem Haare durchbohrt (weil das Exsudat im Follikel ist, und durch die Con- gestionsröthe um den Follikel das Haar [auch <i>lanugo</i>] sichtbar gemacht wird) und haben gesunde Haut- stellen zwischen sich. Diese besprochenen Flecke verbreiten sich vom Gesichte aus über den ganzen übrigen Körper bis auf die Füsse. — Die Röthe ist blass- und gleichmässig roth, bis sie sehr blass und endlich nach 4 — 6 Tagen gelblich wird. (Diese Farbenverän- derung geht das Exsudat ein).	In den ersten Tagen die- ser Periode ist noch immer eine Steigerung der be- gleitenden katarrhalischen Symptome nachzuweisen, jedoch geht der beginnen- den Entfärbung (Erblas- sen) des Exanthems eine Abnahme derselben zur Seite.
IV. Stadium, (<i>Desquamatio- nis</i>) dauert 6 — 8 Tage.	Völlige Fie- berabwesenheit.	Desquamation zuerst wieder im Gesichte, wo die ersten Flecke wa- ren; die Schuppen sind jedoch ge- trennt stehend, entsprechend der Localisirung der frühern Flecke.	Alle katarrhösen Er- scheinungen lassen noch mehr nach, es tritt Expec- toration ein, und am Ende verschwinden sie alle.
Scarla- tina (Scharlach).	I. Stadium, wie bei Morbillen.	Wie bei Mor- billen.	Concentration der katar- rhösen Erscheinungen auf die Rachenhöhle, somit schon jetzt anginöse

Stadium und Dauer desselben.	Fiebererscheinungen.	Erscheinungen an der Haut.	Begleitende Erscheinungen.
			Phaenome, die einen scarlatinösen Hautprozess zu vermuthen berechtigten.
II. Stadium, wie bei Morbillen.	Wie bei Morbillen.	Am Halse zuerst an einer oder der and. Seite entsteht eine Röthung, die beim Fingerdrucke schwindet.	Steigerung der anginösen Beschwerden.
III. Stadium, wie bei Morbillen.	Wie bei Morbillen.	Die rothen zusammenhängenden Flecke am Halse verbreiten sich von hier aus mehr über den ganzen Körper als über das Gesicht. — Sie haben eine intensive Röthe als bei Morbillen, und die Röthe ist punktirt, nicht gleichmässig (weil der Papillarkörper der Haut bedeutend injicirt ist.) Sie erblasst in den letzten Tagen und wird gelblich.	In den ersten Tagen noch immer Steigerung der anginösen Symptome, aber auch die Zungenwärtchen bedeutend geschwellt (entsprechend der Papillarinjection der Haut). In den letzteren Tagen mindern sich mit der Entfärbung des Exanthems die anginösen Beschwerden.
IV. Stadium, wie bei Morbillen.	Wie bei Morbillen.	Die Abschuppung geschieht zuerst am Halse, und entsprechend den früher zusammenhängenden	In diesem Zeitabschnitte ist eine Abnahme und gänzlich Verschwinden

			Flecken sind auch zusammenhängende Schuppen, so dass die Epidermis oft die Form desjenigen Theiles beibehält, von dem sie sich trennte. — Von den Händen in Form von Handschuhen. — Die Desquamation wiederholt sich 2 — 3 mal, was von der Menge des darunter gelegenen Exsudates abhängt.	der Angina zu bemerken. NB. Somit sind die anginösen Symptome diejenigen, die im Anfrange Scarlatina von Morbilen unterscheiden lassen. Später trägt das Auftreten intensiv- und punktirt rother, zusammenhängender Flecke zuerst am Halse zur Sicherstellung der Diagnose bei.
Variola. a) V. vera, dauert im Ganzen 14—28 Tage.	Es gibt eigentlich nur Eine Variola, und ihre Verschiedenheit wird bedingt durch die Vaccination, und durch die Menge und Qualität der Individuen, durch welche das Contagium gegangen ist. Diese Verschiedenheit (Modification) wird erkannt aus den Erscheinungen, die die einzelnen Arten in ihrem Verlaufe und ihrer Entwicklung zeigen. Wir unterscheiden:			
	I. Stadium, dauert 3—4 Tage.	Das Fieber ist mehr weniger heftig. Eine Abendexacerbation übertrifft die andere.	Einfache brennende Hitze der Haut.	Bedeutende Schmerzen der Gelenke und der Rückenwirbelsäule (am Kreuz besonders deutlich ausgesprochen); nebstbei gastrische Erscheinungen.
	II. Stadium, dauert 24 — 48 Stunden, auch 3 Tage.	Die Fieberparoxysmen sind noch heftiger und deutlicher ausgesprochen,	Während einer stärkern abendlichen Exacerbation entstehen rothe, getrennt-stehende Flecken zuerst im Gesichte, die auf dem übrigen Körper anfangs wenig	In dieser Zeit ist eine Steigerung der gastrisch-katarrhösen Symptome constant. NB. In diesem Stadium ist leicht Verwechslung möglich mit Mor-

Stadium und Dauer desselben.	Fiebererscheinungen.	Erscheinungen an der Haut.	Begleitende Erscheinungen.
	als im vorigen Stadium.	verbreitet sind. Diese Flecke verdanken ihren Ursprung einem in und um den Follikel gebildeten Exsudate, und dem in der Nähe dieses Exsudates statthabenden grossen Blureichthume (injicirte Gefässe.) Hebt man die über einen solchen Fleck gelagerte Epidermis ab, so findet man eine m e m b r a n ö s e Schichte.	bilden, weil die rothen, getrennt stehenden Flecke in beiden Fällen zuerst am Gesichte entstehen, und das Fieber und die begleitenden Symptome gleich sein können.
III. Stadium, (<i>floritionis</i>) dauert 3—6 Tage.	Die Fiebererscheinungen lassen nach. Man darf hieraus auf kein Aufhören der Krankheit schliessen, weil das nächste Stadium den weitem Fortgang des Prozesses nachweist.	In der Mitte eines jeden Fleckes wird ein Stigma sichtbar, und an denjenigen Körpertheilen, wo früher keine Flecke waren, entstehen solche erst jetzt. Aus dem Stigma wird nach 24 Stunden eine Papula, und aus diesem wieder nach 24 Stunden ein Bläschen. Wird ein solches Bläschen eingestochen, so tritt nur theilweise dessen Inhalt aus. (Das Stigma wird erzeugt weil die Exsudation im Follikel zunimmt, durch ferneres Exsudatpro-	Die gastrisch katarrhösen Erscheinungen des frühen Stadiums sind dieselben, jedoch im minderen Grade vorhanden. NB. Jetzt erst kann man bestimmen, dass diess Exanthem zur Blatterform sich entwickeln wird, ohne jedoch im Stande zu sein, die Art anzugeben.

IV. Stadium, (<i>Suppurationis</i>). Ein den wahren Blattern eigen- thümliches. Dauert 3—6 Tage, entsprechend der	Wiederein- tritt des im vo- rigen Stadium fast verschwun- denen Fiebers, und zwar mit dem Charakter eines Supura-	duckt wird die Epidermis zum Knöt- chen und endlich zum Bläschen em- porgehoben. Dies letztere hat je- doch einen fächerartigen Bau, indem von der Pseudomembran und von der Epidermis Fäden von oben nach abwärts zur Bläschenbasis sich spinnen, somit wäre auch das theil- weise Ausfliessen des Inhaltes erklärt). Jedes Bläschen ist von ei- nem Haare durchbohrt (weil in je- dem Follikel ein Haar sich vorfin- det) und jedes hat eine Vertiefung (eine Delle) an seiner Spitze, (weil das Exsudat dort wo die Epidermis das Haar umgreift und umkleidet, gehindert ist eben so hoch zu stei- gen, als in dem übrigen Raume zwi- schen Haar und Follikel).	
		Der Bläscheninhalt wird getrübt, und sie umwandeln sich in Pusteln, wovon jede einzelne einen <i>halo</i> be- kömmt. — Die Pustel entsteht durch eiteriges Zerfliessen des Bläschen- inhaltes, der Pseudomembran und der Exsudatfäden, die sich hinab- gesponnen. — Sie werden somit ih-	In den ersten Tagen nimmt die Reihe der ca- tarrhösen Phaenomene zu, bis sie in der Letztzeit die- ses Stadiums gänzlich ver- schwinden.

Stadium und Dauer desselben.	Fiebererscheinungen.	Erscheinungen an der Haut.	Begleitende Erscheinungen.
Zeit der Bläschenbildung.	tionsfiebers, das aber gegen Ende dieses Zeitabschnittes aufhört.	ren Inhalt ganz entleeren wenn sie an irgend einer Stelle angestochen werden. — Die Eiterung tritt in derselben Ordnung auf, in der die Bläschen bei ihrer Entwicklung zum Vorschein kamen, und zwar zuerst im Gesichte und dann am übrigen Körper.	
V. Stadium, (<i>Decrustationis</i>). dauert 8—14 Tage.	Gar kein febriles Symptom.	Die Pusteln vertrocknen und bilden Krusten, und in derselben Ordnung als die Pusteln entstanden sind, stellt sich die Borkenbildung ein. Somit zuerst im Gesichte. Nach Abfallen der Krusten bleiben noch für längere Zeit braune Pigmentflecken zurück.	Keine.
b) V. modificata, dauert im Ganzen 9—12 Tage.	Fieber in allen Stadien geringer, wie bei <i>V. vera</i> .	Das Exanthem entsteht zuweilen zuerst im Gesichte, zuweilen aber auch an andern Körpertheilen. — Uebrigens verhalten sich die Veränderungen der Hautruption ganz so wie bei der <i>V. vera</i> , nur dass	Die Reihe der catarrhosen Symptome ist in allen Stadien schwächer ausgesprochen.

<i>purations-Station.</i>		hier der Prozess ein viel rascher ist.
c) Varicella. Die Gesamtdauer 3—7 Tage.	Hier fehlt oft das I. Stadium, und die andern verlaufen sehr rasch.	Oft stark, gewöhnlich schwach in allen Stadien.
		Das Exanthem hat denselben Verlauf, nur mit dem Unterschiede, dass er sehr rasch ist, und jederzeit Nachschübe macht.
		Oft gar keine. Gewöhnlich schwach entwickelte Katarrhe.

B. Abnorm verlaufend.

1. Morbilli verlaufen regelwidrig:

M. confluentes, die Flecke sind nicht getrennt, sondern wie bei *Scarlatina* zusammenfließend, dabei ist starkes synochales Fieber und die charakteristischen katarrhösen Erscheinungen (diese Form ist die *Rubeola* des Schönlein).

M. papulosi, auf den getrennt stehenden Flecken sind Knötchen sichtbar. Sie verdanken ihren Ursprung dem stärkeren Exsudate in dem Follikel.

M. vesiculosi, statt des Knötchens erscheint ein Bläschen,

M. nigri, wo die Flecken durch Blutaustritt (*Extravasat*) bedingt sind.

M. synochales, diesen entspricht die confluierende Form.

M. putridi, diesen entspricht die Form der *M. nigri*.

M. nerrosi, bei welchen die Form des Exanthems nicht geändert ist, sondern nur das Fieber.

Nach der Form des Exanthems.

Nach dem Fiebercharakter.

M. abortivi, wenn das eine oder das andere Stadium fehlt, d. h. im Verlaufe des Exanthems übergangen wird.

Nach der Ausbildung.

Febris morbillosa sine exanthemate, inwiefern bei Epidemien nur die begleitenden Symptome bei einem Individuum zum Vorschein kommen, jedoch ohne Exanthembildung.

In Beziehung der Nachkrankheiten

Bleiben oft Drüsenkrankheiten der Haut und der Eingeweide zurück, Lungenkrankheiten, wie Bronchial-Blennorrhoe mit deren Folgen (wie Herzkrankheiten, *Tuberculosis* etc.), auch *Oxaena*.

2. *Scarlatina* verläuft regelwidrig:

Sc. variegata, die Flecke stehen getrennt von einander, dann sind die begleitenden anginösen Erscheinungen das Unterscheidende.

Nach der Form des Exanthems.

Sc. vesiculosa (miliaris). Auf einem zusammenhängenden rothen Boden sind kleine, von einander getrennt stehende, mit heller Flüssigkeit gefüllte Bläschen (kommen von einem stärkeren Exsudate in dem Follikel, wodurch die Epidermis gehoben wird).

Sc. synochalis.

Nach dem Fiebercharakter.

Sc. nervosa.

Sc. septica.

Nach den begleitenden Erscheinungen.

Sc. anginosa, wenn die anginösen Symptome besonders stark entwickelt sind, so dass sie die meisten Beschwerden veranlassen.

{ *Sc. gangraenosa*, wenn an einer Stelle des Rachens Brand eintritt.
 { *Sc. gastrica*, wenn sich zu den anginösen noch gastrische Erscheinungen ge-
 sellen.

{ *Sc. abortiva*. Ein oder das andere Stadium wird bei der Durchbildung des
 Exanthems übergangen.

{ *Febris scarlatiosa sine exanthemate*. Wenn bei Scharlach-Epidemiceen heftige
 Angina ohne Exanthem verläuft.

Nach der Ausbildung des
Exanthems.

{ Es entstehen Verlust der Sinnesorgane (des Geruchs insbesondere), Läh-
 mungen, *hydropes, excema, furunculi* etc.

Nach den Nachkrankheiten.

3. Variola. Hier finden sich dieselben Abnormitäten, wie bei den früheren Exanthemen. Insbesondere aber erscheint:

die **Variola modificata,**

nach der Grösse als

{ *V. miliaris*, wo die Form sehr klein ist.
 { *V. pemphygoides*, wo die Form sehr gross ist.

{ *V. abortivi* (Vid.: *Morbilli abortivi*.)

nach der Ausbildung:

{ *Nirius*, das Exanthem bleibt bei der Bildung der Papula stehen.

II. Exanthemata relativa.

14

Bei diesen exanthematischen Hautkrankheiten

1. kann das Fieber vorhanden sein oder auch fehlen, eben so
2. das *Stadium prodromorum*.
3. Die Form ist eine verschiedenartige bei den einzelnen Arten.
4. Ihre Röthe verschwindet beim Fingerdrucke, und macht einer gelblichen Färbung Platz (weil das Exsudat in der Haut eigentlich gelb aussieht, und nur die beigesellte Congestion dies Roth verursacht). Dieses Symptom haben sie mit den wahren Exanthemen gemein.
5. Wird das Contagium nur zu gewissen Zeiten oder an bestimmten Orten entwickelt.

Hierher gehören:

1. Erythema (exsudativum).

Dies ist eine diffuse Hautröthung (die somit aus zusammenhängenden Hautflecken besteht), beim Fingerdrucke keiner normalen, sondern gelblichen Färbung Platz macht, und nicht vorübergehend ist, sondern längere Zeit anhält, u. wenn sie schwundet, mit Abschuppung endet. Dieses Übel ist während des ganzen Verlaufes nicht von Jucken begleitet.

a) Nach dem Verlaufe, als:

α) *Eryth. febrile (fugax)*. Meistens bei Kindern (selten bei Erwachsenen) finden sich fieberhafte Aufregungen, die von gastrischen Symptomen begleitet sind, und mit denen sich Anfangs Gedunsenheit, dann Röthung der Haut verbinden. Allein die Letztere verschwindet nach 24—48 Stunden, und endet mit Desquamation. (Die begleitenden Symptome sind hier nicht in der Rachenhöhle und nicht in dem Respirationstrakte, und somit schon hiedurch im Anfange unterschieden von *Scarlatina* und *Morbillen*.)

β) *Er. afebrile, verläuft ohne* } *Er. papulatum*. Auf der zusammenhangenden rothen Haut entstehen noch röthere Erhabenheiten.— Es

Dieses Erythem tritt verschieden auf.

Stad. prodromorum und ohne Fieber. — Die Gesamtdauer ist von 4—14 Tagen; man unterscheidet:
Nach der Form:

ist meistens lokalisiert am Vorderarm und derselben Hand, am Unterschenkel und dem Fusse derselben Seite.

Er. tuberculatum. } Beide sind
Er. nodosum (knotiges). } eben so,
wie das frühere, durch ein stärkeres Exsudat bedingt.

Er. mamellatum, wenn jeder Knoten noch von einem kleineren Knötchen besetzt scheint. — (Dies letztere ist das Haar, welches in jedem Follikel sitzt.)

Er. marginatum, der rothe Fleck ist auf der einen Seite wie abgeschnitten, auf der andern verwischt.

Er. iris, rother Kreis, der eine gesunde Haut einschliesst.

Er. annulare, wenn der Kreis grösser ist.

Er. gyratum, wenn die einzelnen Kreise an ihren Peripherieen zusammenfliessen.

Er. laeve, ist die gespannte, geröthete, glänzende Oberfläche eines oedematösen Hauttheiles.

NB. Sind wahrscheinlich nur abortive, vesiculöse oder pustulöse Formen.

b) Nach der
Zeit, als:

Er. epidemicum (Acrodynia, neolepra Parisiensis). Rothe Flecken entstehen auf den Handtellern und Fusssohlen, im späteren Verlaufe auch auf den Gelenken, die mit Abschuppung enden; wobei aber die einzelnen Schuppen sich anhäufen, und hornartige Lamellen dieser Gegenden darstellen, die entweder abfallen, um dass Neue sich wieder bilden, oder es werden an der Stelle, wo sie aufgesessen, rothbraune schwarze Flecke sichtbar, die verschwinden und sich in geschwürige Flächen umwandeln.

c) Nach dem
Orte, als:

Er. endemicum (Pellagra). [An den Ufern des Po und um Pavia herum einheimisch.] Diese Hautkrankheit beobachtet drei Grade in ihrer Entwicklung.

1. Grad. Rothwerden derjenigen Hautstellen, die der Sonnenhitze, während des heissen Sommers, ausgesetzt sind. Das Übel besteht den Sommer hindurch, und verschwindet im Herbst mit Desquamation, um im nächsten Sommer wieder zu erscheinen.

2. Grad. Braungefärbte Haut, mit hornartiger schwarzgefärbter Epidermis — was von der Anhäufung der braungefärbten Schuppen herührt — die, wenn sie abfällt, einen braunen oder auch nur einen rothen Fleck zurücklässt.

Es entstehen dann Rhagades oder Geschwüre an den früher erkrankten Stellen, und daemotisch melancholische Stimmung sind die constanten Begleiter. Diese Gemüthsänderung ist aus einem chronischen Exsudate an den Gehirnhäuten — ähnlich dem der Haut — zu erklären.

3. Grad. Die Geschwüre des vorigen Grades werden brandig, so dass Verlust der Extremitäten in Folge brandigen Absterbens eintreten, und die Gemüthsverstimmung wird noch bedeutender, bis endlich langwieriges Hinsiechen und der Tod erfolgt. — Die Section weist die oben besprochene Affection der Gehirnhäute nach.

2. Roseola.

Nennt man jene Hautkrankheit, die mit oder ohne Fieber, unter der Form rother, von einander getrennt stehender, über den ganzen Körper oder einen Theil desselben verbreiteter Flecke, jedoch ohne begleitende katarhöse Symptome verläuft. Übrigens verhalten sich diese Flecke, so wie alle durch Exsudat in der Haut

R. idiopathica.

R. aestiva
R. autumnalis } *vulgaris.*

R. variolosa, eine diffuse Fleckröthung bei *Variola*, die aber verschwindet, sobald die *Variola* selbst zum Ausbruch kommt. (Sie ist eigentlich eine Erythemform.)

R. symptomatica.

R. vaccinea. Es entstehen bei vaccinirten Kindern in den ersten 4—8 Tagen von der Ein-

Nach der Entstehung.

standene. Demnach ist dieses Exanthem unterschieden:

α) von einem Erythem, weil Letzteres nur zusammenhangende Röthe zeigt;

β) von Morbillen, die stets schon in ihrem *Stadio prodromorum* stark entwickelte katarrhöse Erscheinungen zu ihrem Begleiter haben;

γ) von *Scarlatina*, die im Beginne schon durch anginöse Phaenomene sich zu erkennen geben.

Man unterscheidet:

Nach der Entstehung.

R. symptomatica.

impfungsstelle aus rothe Flecke, die sich von hier aus über den Arm und übrigen Körper verbreiten.

R. cholera } sind begleitende
R. typhosa } zufällige Exantheme bei den genannten Krankheiten.

R. rheumatica (Pelliosis). Bei an Rheumatismus Leidenden sind zuweilen rothe, beim Fingerdrucke nicht schwindende Flecke, nur an den untern Extremitäten und dem Stamme, nie im Gesichte.

Ros. annulata. Runde silbergroschengrosse Flecke dehnen sich peripherisch aus, und in dem Maasse ihrer peripherischen Ausbreitung erblassen sie im Centro; somit stellen sie immer rothe Kreise dar, deren jeder eine gelbe (nicht normal gefärbte) Haut einschliesst — Diese Färbung ist von dem Exsudate an dieser Stelle abzuleiten — und ist zu unterscheiden von *Erythema iris*, bei der die Kreise eine gesunde Haut umgeben.

Nach der Form.

3. Urticaria.
Nesseln.

Ist jene Hautkrankheit,
die unter der Form von
Quaddeln erscheint, und mit
vielm Jucken verbunden
ist.

Man unterscheidet:

Nach der
Anwesen-
heit des Fie-
bers.

Urt. febrilis.

Urt. afebrilis,
die ohne Fie-
ber verläuft.
Sie ist nach
der Dauer:

ephemera, die nur eine eintägi-
ge Dauer hat;

evanida, die länger als 1 Tag
besteht, und wieder ver-
schwindet.

perstans, die typisch auftritt,
unter bestimmten Verhältnis-
sen oft kömmt, und wieder
aufhört, wenn Letztere vor-
übergehen.

Urt. rubra. Die Quaddeln sind roth, und die umge-
bende Haut ist weiss.

Urt. alba (porcellana). Die Quaddeln sind weiss,
und die Umgebung roth.

Nach der
Färbung.

Urt. conferta, wo kein Zwischenraum zwischen
den einzelnen Quaddeln ist. Diese Form könnte
mit *Scarlatina* und *Erythem* verwechselt werden,
allein das stärkere Jucken und der Umstand, dass
eine conferte Quaddelform meistens von der Ein-
wirkung einer äusseren Ursache bedingt wird,
und nur mit ihr besteht, lassen leicht eine Un-
terscheidung machen.

Nach der
Aggregation
der einzel-
nen Quad-
deln.

4. Miliaria. Friesel.

Ist ein mit febrilen Erscheinungen und getrennt stehenden, hirsekorngrossen, mit einer hellen oder milchweissen Flüssigkeit gefüllten Bläschen verlaufendes Exanthem. Man theilt sie ein:

Nach der Art des Entstehens:

a) *M. idiopathica*, die ganz nach der Art der Exantheme verläuft, und die einzelnen Stadien durchmacht.

1. Stadium. Unbeschreibliche Angst, Schlaflosigkeit, Delirien bilden den Anfang der Vorläufer; hiezu gesellen sich eigenartige, stechende, unangenehme Gefühle in den Finger- und Zehenspitzen (*stupor pungativus* genannt), und bedeutende rheumatische Gliederschmerzen. Die Haut trieft vom Schweisse (*sudor largus*), der nach faulem Stroh oder Knoblauch riechen soll. Die Dauer dieser Zeitperiode ist von einigen Stunden bis 2 Tagen.

2. und 3. Stadium. Während einer Fieberexacerbation brechen zu allererst am Halse hirsekorn grosse Bläschen auf, die entweder auf einer gerötheten Basis aufsitzen oder auch nicht — daher *Miliaria alba* oder *rubra* heissen — und die von dem Ausgangspunkte aus gruppenweise Nachschübe an allen Stellen des Körpers machen, oder auch gleichzeitig über den ganzen Körper sich verbreiten. Die begleitenden Erscheinungen des ersten Stadiums verschwinden, sobald Efflorescenz an der Haut sich herausbildete.

4. Stadium. Alle diese Bläschen enden mit Desquamation. In dem Falle gruppenweiser Nachschübe wird auch die früher gebildete Gruppe früher sich abschuppen, als die später entstandene. (Es soll jede Gruppe beiläufig 7 Tage dauern.)

Miliaria epidemica (der englische Schweiss), ist diejenige Form, bei welcher viel Schweiss ohne Ausbruch des Exanthems besteht, sie ist somit eine *Febris miliaris absque exanthemate*.

b) *M. symptomatica*, die zufällig bei gewissen Typhus-Epidemien meistens an den Seiten der Brust sich zu entwickeln pflegen. Die Bläschen haben den Charakter der Miliar-Bläschen überhaupt, haben aber das Eigenthümliche, dass sie mit dem andrückenden Finger von einer Stelle zur andern sich fortschieben lassen — welcher Umstand eigentlich am besten die Annahme von dem Sitze der Bläschen im Schweisskanale widerlegt, und beweiset, dass sie durch ein wässriges Exsudat zwischen *Epidermis* und *Cutis* erzeugt werden.

Miliaria arthritica, bei Gichtischen, } sind keine eigentliche Miliarien,
Miliaria uterina, bei Wöchnerinnen, } sondern Eczeme, die durch ein äusseres Moment — die Wärme der *Cataplasmata* — entstehen.

5. Erysipelas od. Dermatitis, ist jede durch Röthung, Geschwulst, Hitze, Schmerz und gestörte Function sich auszeichnende Hautkrankheit. Dem Wesen nach sind also beide gleiche pathologische Vorgänge, die auch mit denselben Erscheinungen sich ankündigen. Die *Erysipele* oder *Dermatitides* werden unterschieden in anatomischer Beziehung:

A. *Erythematöse*, die in der oberflächlichen Schichte der Haut sitzen, und bei welchen alle genannten Entzündungs-Erscheinungen, nur im geringeren Grade vorhanden sind; so mit die Röthung beim Fingerdrucke verschwindet, und eine gelbliche Färbung zurücklässt — ein allen Exsudaten der Haut zukommendes Symptom.

Der Umfang der Theile nicht so bedeutend.

a) *Erys. eryth. idiopathicum*, das durch ein äusseres Moment entstanden, durch unmittelbare Einwirkung einer äussern Schädlichkeit. Hieher gehören:

1. *Erythema intertrigo* (*Paratrimma*), das dadurch entsteht, dass die eigenen Excrete oder Secrete nicht entfernt werden können, wie z. B. bei unrein gehaltenen Kindern in der Schenkelbiegung, bei fettleibigen Weibern unter den Brüsten, bei fetten Hinterbacken (der Wolf genannt) etc. In allen diesen Fällen wird die *Epidermis* erweicht und durch darauffolgende Reibung entfernt, was das freie Austreten des *Epidermialplasma* begünstigt, und das beständige Nässen der afficirten Theile entstehen lässt.

2. *Erythema coccigeum* (*Paratrimma coccigeum*), ist das I. Stadium des *Decubitus* in der Steissbeingegegend, und entsteht durch den Druck auf diesen Theil.

tend vermehrt ist, und folglich auch der Schmerz kein so heftiger ist, sondern nur als ein unangenehmes Gefühl der Spannung sich äussert — weil das Exsudat nur ein geringes ist, das mit Zertheilung endet, die mit Abschuppung auftritt.

Nach dem oberflächlichen oder tieferen Sitze der Entzündung, in:

Dieses erythematöse Erysipel ist wieder nach Art des Entstehens:

3. *Dermatitis combustionis*, die wieder 3 Grade hat; nach dem Wärmegrade, welcher einwirkt:

erythematosa, wenn die Hitze nur oberflächlich und flüchtig einwirkte, und nichts als Röthung bewirkte, die mit Desquamation endigt.

bullosa, wenn die Hitze durch längere Zeit und in höherem Grade einwirkte, so dass ein bedeutenderes seröses Exsudat die Epidermis in Blasenform aufhebt.

escharotica, der Wärmegrad ist so heftig, dass eine Verschorfung des berührten Theiles erfolgt.

4. *Dermatitis congelationis*, die eben so wie die durch Wärme Entstandene, nach d. graduellen Einwirkung der Kälte eintheilen ist in eine

erythematosa,
bullosa,
escharotica.

NB. *Erythema Pernio* (Frostbeule) ist eigentlich das Produkt einer früheren Erfrierung, und stellt ein durch eine vorausgegangene dermatische Congestion zurückgebliebenes Exsudat in der Haut dar.

5. *Erysipelas traumaticum* oder *Erythema traumaticum*.
6. *Erysipelas venenatum*, z. B. durch *Rhus toxicodendron*.

6. *Diphtheritis cutanea* (der Hautroup) wird jener grauweissliche Beschlag an epidermislosen Stellen genannt, der an der Grundfläche festsetzt, nicht weg- gewaschen werden kann, und sich an dem zunächstlie- genden Epidermisrande in seiner Ausdehnung begreänzt.

b) *Erys. erythematosum symptomaticum* ist das eigentliche Erysipel oder Rothlauf, das durch ein im Organismus selbst gelegenes Moment bedingt, zum Ausbruche kömmt, einen typischen Verlauf hat, und somit mit Recht zu den Exanthemen gerechnet werden kann. Auch bei diesem unterscheiden wir wieder in Beziehung des Verlaufes:

a) **Einen normalen Verlauf.**

Stadium und Dauer desselben.	Fiebererscheinungen.	Erscheinungen an der Haut.	Begleitende Erscheinungen.
I. Stad., dauert einige Stunden bis 2 Tage.	Fieber-Aufregungen, die mehr weniger den gastrischen Anstrich haben.	Allgemeine Hautwärme.	Zuweilen schon im Anfange meningitische Symptome.
II. Stad., das eben so unbestimmt	Fieberanfälle sind noch heftiger.	Rothwerden des Mittelpunktes derjenigen Hautstelle, die später dem gänzlich entwickel-	Die Gehirn-Symptome sind noch mehr ausgesprochen, als früher.

Stadium und Dauer desselben.	Fiebererscheinungen.	Erscheinungen an der Haut.	Begleitende Erscheinungen.
anhält, als das Erste.		ten Rothlaufe seine Ausbreitung gestattet. (Also wenn Gesichtsröthe sich entwickeln soll, so wird die Nase zuerst roth.) Nebstbei fehlen die oben genannten Entzündungserrscheinungen, wie: Gesschwulst, spannender Schmerz etc. nicht.	
III. Stad., dauert 9-10 Tage.	In der Erstzeit ist das Fieber stärker, in den letzten Tagen geringer.	Vollkommene Ausdehnung der im II. Stad. besprochene Röthung und gesteigerte Ausbildung der übrigen Erscheinungen.	Wie das Fieber, so hält auch diese Symptomengruppe in der Zeit ihre Verstärkung und Verminderung bei.
IV. Stad., von unbestimmter Dauer.	Völlige Fieber-Abwesenheit.	Lamellöse Desquamation, weil das Exsudat unter der Epidermis, als ein zusammenhängendes, abgelagert ist.	Keine. NB. Als normal verlaufendes Erys. heisst es auch <i>laevigatum</i> .
β) Einen abnormen Verlauf, und man unterscheidet: { In Beziehung des Fiebercharakters. { <i>Erys. phlegmonosum</i>, <i>Erys. putridum</i>, <i>Erys. nervosum</i>, } sind eigentlich Übergangs - Stadien und keine Species.			

Erys. vesiculosum, wenn sich kleine Bläschen auf dem Boden des Rothlaufes entwickeln (in Folge einer Exsudatzunahme).

Erys. bullosum, wenn durch Zusammenfliessen der Bläschen grössere Blasen sich bilden.

Erys. pustulosum, wenn der Blaseninhalt eiterig wird.

Erys. crustosum, wenn die letzte Form zur Borke vertrocknet.

Erys. gangraenosum, wenn die erkrankte Fläche brandig zu Grunde geht (in Folge heftiger Spannung durch die Quantität des entwickelten Exsudates).

Erys. oedematosum, wenn in der Umgebung oder an der erysipelatösen Stelle selbst wässrige Ergiessung statt findet.

Ignis sacer, wenn einige oder alle Modificationen der Form bei einem Individuum vorkommen.

(*Erys. fixum* ist dasjenige, welches an derselben Stelle bleibt, wo es im Anfange sich lokalirte, ist somit die Eigenschaft eines jeden normal verlaufenden).

Erys. migrans, bei welchem die Stelle des ersten Auftretens zugleich der Ausgangspunkt einer weitem Ausbreitung der erysipelatösen Röthe ist. In diesem Falle ist jede neue Röthung immer scharf abgegränzt (wie abgeschnitten) von den gesunden Theilen, wohin es erst sich auszudehnen hat, und vermischt mit den

In Beziehung der äussern Form.

In Beziehung der Ausbreitung.

zuvor befallenen Hauttheilen. Da nur die Röthung wandert, das Exsudat jedoch an dem Orte zurückbleibt, wo es abgelagert wurde, so erklärt sich, warum die befallenen gewesenen Parteen gelb gefärbt sind.

a) *Erys. phlegmonosum idiopathicum*, dasselbe, das durch ein äusseres Moment (Verletzung) entstanden. Hieher gehören:

1. *Dermatitis combustionis escharotica*.

2. *Dermatitis congelationis escharotica*.

3. Die circumscribte Entzündungs - Geschwulst, die einem stärkeren Stosse, Bisse etc. ihren Ursprung verdankt.

b) *Erys. phlegm.*

1. *Furunkel*, der dadurch erzeugt wird, dass ein circumscribter Exsudatkörper in die Cutis selbst, oder in das subcutane Zellgewebe abgesetzt wird, um welchen sich eine reactive Entzündung entwickelt — die die Entfernung des Exsudates zum Zwecke hat — und die in Eiterung ausgeht. In Folge dieser eiterigen Zerfliessung wird die darüber gelagerte Haut im-

symptomatischum, oder *Pseudoerysipel*, das d. Ausdruckeines innern Krankheitsprozesses ist. Man unterscheidet dasselbe:

Nach der Ausdehnung, als:

B. *Phlegmonöse*, die in tiefern Hautschichten, ja sogar im subcutanen Zellgewebe ihren Sitz haben, und bei denen die Entzündungs - Erscheinungen stärker entwickelt sind, somit:

die Röthung eine intensivere, so dass sie durch den Finger nicht wegdrückbar ist;

die Anschwellung eine grössere, weil das Exsudat in bedeutender Menge abgesetzt wurde, und aus demselben Grunde ist auch

der Schmerz heftiger, und der Ausgang in Eiterung und

B r a n d leicht gegeben (wenn nicht die Intensität des Entzündungsprozesses gemildert wird).

Sie ist (so wie die erythematöse) nach der Art des Entstehens ein:

mer dünner, bis sie endlich zerreisst. Durch diese Öffnung tritt dann Eiter und ein Propf aus — der nicht abgestorbenes Zellgewebe ist, sondern den Rest des Exsudatkörpers darstellt *).

Nach der Anzahl der Öffnungen benahmt man, einen:

furunc. simplex, wo nur eine Öffnung ist.

furunc. vespajus (Wespenähnlicher), wo mehrere Öffnungen sind, die in einem Kreise beisammen stehen.

*) *Hordeolus* ist ein Furunkel eines Schleimhaut-Folikels des Auges.

Acne pustulosa ist ein Furunkel in einem Follikel der Haut.

Es gibt übrigens Follicular-Furunkel in der Genitalschleimhaut des weiblichen Geschlechtes, die ein Geschwür hinterlassen, das einem syphilitischen ähnlich, und von demselben aufmerksam zu unterscheiden ist.

forunc. panulatus, weberschilfrohrähnlich, wo die vielen Öffnungen in einer Längenausdehnung zueinander stehen.

2. *Anthrax* stellt denselben Krankheitsprozess, wie der *Furunkel* dar, nur ist der Exsudatkörper hier so ausgedehnt, dass durch dessen constanten Druck die überliegende Haut schnell brandig wird. Auch hier folgt secundäre Entzündung und eiteriges Zerfließen des ganzen Exsudatkörpers in noch rascherem Gange.

Zweite Klasse.

Die makulösen Hautausschläge (*Efflor. maculosae*).

Hieher gehören jene Formen, die mit einer einfachen Farbenveränderung der Haut einhergehen. Diese Farbenveränderung ist auf einem grösseren oder kleineren Raume beschränkt, und bedingt die Grösse der Flecke; sie ist temporär oder constant, je nachdem die Ursache liegt im Blute, in den Gefässen oder im Pigmente.

A. Im Blute. Dieses begünstigt

a) Congestionsflecke, in Folge von Blutandrang. Es entstehen rothe, über den ganzen Körper oder einen Theil desselben ausgedehnte Flecke, die beim Fingerdrucke schwinden, und eine gesund gefärbte Haut zurücklassen, durch eine äussere Ursache hervorgebracht, nur temporär mit ihr bestehend, ohne Fieber verlaufend, und wieder verschwinden, ohne eine Spur ihres Daseins zurückzulassen.

b) Stasenflecke, die in Folge von gehemmter Circulation auftreten, als Sie bedingen Blaufärbung derjenigen Theile, die sonst roth sind.

c) Extravasate, die beim Fingerdrucke nicht schwinden, sondern dieselbe Färbung beibehalten, wie vor demselben.

a) *Purpura apoplectica*, wenn das Blutexsudat durch Gefässzerreissung erzeugt wird. Diese

aa) *Idiopathica*.

1. Die durch äussere Gewalt entstanden, z. B. durch Stoss, Schlag, durch Flohstiche, *Purp. pulicosa*. Wenn ein solcher neu ist, so sieht man einen circumscribten rothen Fleck, auf dessen Mittelpunkte ein kleinerer noch rötherer sitzt. — Der Grössere ist Reactionsröthe und verschwindet bald, und nur der Kleinere bleibt zurück, weil er einem Blutaustritte seinen Ursprung dankt. Die *Purpura typhosa* ist von ihr zu unterscheiden.

Nach ihrem Ent- stehen zerfal- len sie in:	theilt man ab in:	
	NB. Rothe Fle- cke, d. beim Fin- gerdrucke nicht verschwinden, heissen <i>Purpu- ra</i> , Punktförmige nennt man <i>Pete- chiae</i> , Streifen- förmige <i>Vibices</i> , Fleckenbildende <i>Ecchymoses</i> .	
		§ß) Sympto- mat., die nur eine Theil- erscheinung einer andern Krankheit darstellt, u. zwar einer
		<i>febrilen</i>
		als cha- rakteri- stisches Symptom.
		den durch die allgemeine Krankheit und nur durch den Ort, wo die Flohstiche am meisten vorkommen (dort, wo die Kleider auf der Haut fest anliegen).
		2. <i>Purp. simplex</i> , synonym mit <i>Roseola rheuma- tica</i> Anderer.
		3. <i>Purp. senilis</i> . Bei Greisen, durch Druck oder Stasen entstandene, gleichmässig abgeschnittene Flecke.
		1. Bei <i>Purp. haemorrhagi- ca</i> oder <i>Morbus Werl- hofii</i> . Dieses Übel tritt plötzlich auf, im Be- ginnne mit Fieber, das von einer Blutexcre- tion aus irgend einem Organe begleitet wird, dem dann Blutflecke auf der Haut folgen. (Diese Krankheit ist eine gut- artige.)
		2. Bei <i>Purp. febrilis sim- plex</i> . Ohne vorausge- gangene blutige Excre- tion aus irgend einem Organe treten Blutflecke auf unter heftigen Fie-

B. In den Gefässen. Hieher gehört die	Teleangiectasie, die eine sichtbar vermehrte Gefässneubildung mit adangirter Blutinjection bildet. Man rechnet hierzu:	herbewegungen. (Sie ist eine sehr böartige Blutkrankheit.)
3. Bei Exanthemen aller Art, wo Blutaustretungen sein können, die man dann <i>Purp. exanthematica</i> nennt.	als zufälliges Symptom.	Bei jeder Dyscrasie, ist somit nicht nur der scorbutischen eigen, sondern auch der syphilitischen, skrophulösen etc.
β) <i>Purpura transsudativa.</i>	Bei der das Blut durch die Gefässwandung durchschwitzt (<i>Exomose</i>), ohne dass das Gefäss selbst zerreisst.	als zufälliges Symptom.
<i>Purpura</i>, nach der Form:	<i>Purp. papulosa</i> (<i>Lichen lividus</i>), hat rothe Papeln, die beim Fingerdrucke nicht schwinden. <i>Purp. urticata</i>, bildet sich aus der <i>Papulosa</i> durch Vergrösserung der Knötchen zu Quaddeln.	afebrilen
1. <i>Naevus vascularis simplex.</i>	2. <i>Naevus vascularis flammeus</i>, vom Centro gegen die Peripherie ausstrahlend.	3. <i>Naevus vascularis fungosus</i>, wenn zwischen der Teleangiectasie-

Im Pig-
mente, und
zwar in des-
sen

tasie viel Zellstoff liegt, und das Ganze etwas hervorragt.
(Wurde fälschlich *fungus haematodes* genannt.)

4. Das erste Stadium der *Acne rosacea*, das, wie wir
sehen werden, zu dieser Zeit auf einer Erweiterung der Ge-
fässenden beruht.

- a) Mangel, *Leucopar-
thia*, die nach der
Ausdehnung eine
- b) Überfluss, der
sich am meisten um
den Follikel herum
abgesetzt zeigt. Hie-
her gehören:

universalis ist (meistens angeboren), oder
partialis, die meistens erworben

Poliosis circumscripta, an einer Stel-
le werden die Haare zeitlich grau.

L. ephelides, wenn sie nur durch den
Einfluss der Sonne — also nur im
Sommer — bestehen.

Lentigines, sind kleine, getrennt
stehende, braune Flecke.

L. perstantes, wo dies nicht der Fall
ist, nämlich bei Säubern, Schwan-
gerschaften, Menstruations - Ano-
malien und Leberkrankheiten.

Cloasma, stellt grössere zusammenhängende, braune Flecke dar.

partiale,
universale,
endemicum.

Melasma, bedeutet einen in's
schwärzliche gehenden Fleck

Naevus spilus nennt man eine zu-
sammengedrängte Menge schwar-
zer Flecke.

NB. Nicht als Pigment - Krankheit, sondern als Farbeveränderung der Haut kömmt
zu erwähnen: *Argyria*. Bleifarbige Flecke. Soll durch den Genuss von Holler-
stein entstehen??

Dritte Klasse.

Die schuppichten Hautausschläge (*Efflor. Squamosae*).

Die Krankheiten dieser Klasse äussern sich durch Abweichungen der Epidermisbildung, und wenn auch nicht alle hieher gezählten Abnormitäten unter der Form von Schuppen erscheinen, so haben sie doch als ein am meisten hervorzuhelbendes Symptom, eine regelwidrige Epidermis. Diese ist fehlerhaft:

A. In Beziehung der Quantität, entweder:

Zu Wenig. Dieser Zustand ist stets mit einer vermehrten Röthung der Haut verbunden, weil die Gefäss-Injection der Cutis mehr durchschimmert. Er kömmt vor:

Schon im physiologischen Zustande, z. B. bei Neugeborenen.

In pathologischen Fällen, wobei nebst der rothen Färbung noch ein Nässen ohne Bläschen bemerkbar wird, weil in Folge des Epidermismangels das Epidermial-Plasma an die freie Oberfläche austritt. Je nachdem diese genannten Erscheinungen auf einem grösseren Raume oder nur linienweise statt finden, unterscheidet man:

Intertrigo, wo aber kein Exsudat unter der Form von Bläschen sich bildet, somit keine Volumszunahme, keine Farbenveränderung zurückbleibt. — Entsteht durch Abreibung der Epidermis. —

Excoriation im zweiten Grade, durch Kratzen erzeugt; dieser ist ausgezeichnet durch einen linienförmigen braunen Schorf — wenn eine glatte Oberfläche — oder durch braune Punkte mit dazwischen liegenden gesunder Haut, — wenn eine papulöse Haut gekrazt wird. — (Diese Schorfe entstehen durch Vertrocknen des Plasma an der atmosphärischen Luft.)

Rhagades (Sprünge, Zerklüftungen), zerspal-
tene Epidermis. Wo die stärkere Röthe
sich vorfindet, ist die Spalte, und wenn
letzte tiefer geht, so tritt auch das Plas-
ma aus.

Zu Viel. In diesem Falle
lagern sich die Epider-
misschichten übereinan-
der, und hieraus erfolgt
eine *Anhäufung* der
Epidermialschichten, die
unter verschiedenen For-
men auftritt, nach dem
Orte und der Art der
Schichtenbildung.

Tylosis (Schwiele). Eine feste gelbe Hautsubstanz sitzt auf irgend einem Körper-
theile auf, dessen Form sie annimmt. Sie sitzt flach auf, und ihre Dicke wird
von der Anzahl der Schichten bedingt, aus denen sie besteht.

Clavus, Leichdorn. Ist eine bis in den Papillarkörper der Haut eingezwängte
Schwiele. Er sitzt senkrecht auf der Cutis auf, hat nicht die Form des Theiles,
der mit ihm behaftet ist (meistens die Zehen), und schmerzt sehr beim Drucke.

Dermatokeras, cornea cutanea. Stellt den höchsten Grad der Anhäufung der Epi-
dermis dar, so dass daraus ein hornartiges hartes Gewebe resultirt. Je nachdem
dieser Vorgang im Haarfollikel oder ausser demselben sich lokalisiert, entsteht
ein riesiges Haar, eine riesige Schwiele.

Verruca, Warze, ist ein hypertrophirter Papillar-
körper, der von gleichartiger Epidermis be-
deckt ist. Sie hat mancherlei Benennung:

Naevus verrucosus, wenn die
Warze angeboren.

V. sessiles, wenn sie breit auf-
sitzt.

V. anchordon, wenn sie stiel-
förmig aufsitzt.

V. myrmikia, wenn sie kronen-
artig sich ausbreitet.

B. In Beziehung der Qualität. Diese qualitative Veränderung der Haut stellt die eigentlichen Schuppenkrankheiten dar. Man rechnet drei Formen hieher:

a) *Pityriasis*, Kleinflechte. Bedeutet eine adaugirte Schuppenbildung, wobei die einzelnen Schuppen auf einer ansehnend gesunden, nicht gerötheten, nicht infiltrirten Haut aufsitzen, an ihr haften, und nur theilweise abfallen. Der befallene Körpertheil sieht aus, als wäre er mit Mehl bestäubt. Man theilt sie ab:

P. universalis, ist eine über den ganzen Körper verbreitete Schuppenbildung. Sie ist meistens nur ein Symptom eines andern Leidens, das mit einer Massenabnahme des Organismus einhergeht (Abzehrung), wobei die spröden Epidermis-Zellen sich der geschmeidigen, jedoch zusammen geschrumpften, darunter gelegenen Cutis nicht accomodiren können, so- mit wie staubig zerfallen; daher:

P. phthisicorum.
P. tabescentium.
P. senilis etc.

P. partialis.

Capitis, die wie-
der nach dem
Grade eine:

furfuracea ist, wo die Schuppen nur auf der Kopfhaut liegen, oder
amiantacea, wo die Epidermis rohr-
förmig auch die Haare umgibt,
weil die Epidermis, die der
Haarwurzel anliegt, auch er-
krankt ist.

Palmae manus
labiorum etc.

1. Nach ihrer Ausdehnung:

Pityriasis simplex. Die Schuppen sind der gewöhnlichen Haut gleich gefärbt, und die letztere ist normal.

2. Nach der Farbe der Haut:

Pityriasis rubra. Die Schuppen sind weiss, doch die darunter gelegene Haut roth, gesund, nicht verdickt.

Pityriasis versicolor. Schuppen auf pigmentirter Haut.

Pityriasis nigra. Schuppen auf schwarzer Haut.

b) *Ichthyosis* (Fischschuppenkrankheit). Bei dieser Krankheit haften die Schuppen länger an der Haut, als im Normal-Zustande. — Es ist keine Consumtion der Epidermis, sondern Verdickung (Hypertrophie) und dunklere Färbung derselben (durch das längere Verweilen an der atmosphärischen Luft). In Folge der Verdickung der Oberhaut entstehen auch tiefere Furchen an denjenigen Stellen, wo an der Haut solche vorhanden sind, und durch diesen Umstand werden polygone Körper wahrgenommen, die von denselben begrenzt werden. — Das Übel ist in einer Atrophie der Talgfollikel gegründet, die ihre Funktion eingebüsst haben, und schliesst somit die Seborrhoe aus. — Man unterscheidet:

Nach dem Grade der Ausbildung:

c. *Psoriasis*. Beginnt mit einer kleinen weissen Schuppe auf einem rothen Punkte, von dem sie abgekratzt werden kann; allein dieser schuppichte Punkt blutet, sobald die letzte Schuppenschichte mit dem Nagel des Fingers abgenommen wurde. — Dies Bluten ist ein nie feh-

Nach d. Evolution (d. h. der Art des Beginnens).

Nach d. Involution (d. h.

I. simplex, bei der die Epidermis nur um das Zweifache verdickt ist.

I. cornea, wo die Epidermis um das Vierfache angewachsen ist.

I. histrix, wo sie um das Vielfache das Volumen der normalen übertrifft.

NB. Nie ist ein Übergang des einen Grades in den andern beobachtet worden, sondern die Form der Erstentwicklung bleibt während der ganzen Dauer der Krankheit. — Auch ist sie immer angeboren, und kommt nie im Gesichte vor, und wo sie als eine Gesichtsthyosis angeführt wird, dort ist sie mit *Acne sebacea* verwechselt worden, welche Letztere, wie wir sehen werden, ganz den entgegengesetzten pathologischen Prozess voraussetzt.

Ps. punctata, wenn sie im Beginne unter der Form kleiner Punkte erscheint.

Ps. guttata, wenn mehrere solche Punkte nahe beisammen stehen.

Ps. numularis, wenn die letzteren confluiren, um eine Münzform darzustellen.

Sobald die Münzform zu heilen anfängt, so schwillt die Haut ab, und zwar zu allererst im Mittelpunkte, und

lendes Symptom in Folge bedeutender Succulenz der Haut. — Die Krankheit besteht in einer Exsudatbildung auf der Oberfläche der Cutis. Unter vielfachen Formen tritt das Übel auf, die wir am besten unterscheiden:

der Art der Zurückbildung).

in Folge dieses Vorganges entsteht ein Einfallen der Mittelschuppe, das somit eine beginnende Heilung bedeutet, und schreitet dieselbe fort, so dass die Central- schuppe gänzlich abfällt, so entsteht:

Ps. orbicularis oder *Lepra Willani*, eine Form, die durch Ausfallen der Centralschuppe und Sichtbarwerden der darunterliegenden gesunden Haut — die keine Volumsvermehrung zeigt — zu Stande kömmt.

Ps. circumscripta,

Ps. diffusa,

Ps. universalis.

Ps. localis. *Ps. ophthalmica* { bestehen nicht allein, ohne dass andere Körpertheile von derselben Krankheit befallen wären.

Ps. labiorum }
Ps. scroti }
Ps. lotorum, Wäscherräude, } sind meistens
Ps. pistoria, Bäckerkräze, } mit Eczem od.
Pityriasis der Hand verwechselt worden, und

Ps. palmarum manus ist die einzige lokale Form, jedoch meistens syphilitischer Natur.

Nach d. Ausdehnung.

Nach d. Verlaufe.

Ps. acuta,
Ps. chronica.

Nach d. Form.

Ps. gyrata, wenn durch Ausfallen einiger Kreissegmente, somit durch Heilung, die geschlängelte Form sich entwickelt etc.

Die Psoriasis kann verwechselt werden mit andern ähnlichen Hautkrankheiten, und zwar: mit *Eczem*, *Pitiriasis*, *Lichen* und *Lupus exfoliatus*. Um diesem Übelstande vorzubeugen und die Unterscheidung machen zu können, dienen genauere Merkmale in der folgenden vergleichenden Tabelle:

	Bei Psoriasis	Bei Eczem	Bei Lichen	Bei Pitiriasis	Bei Lupus exfoliatus
Die Schuppen	sind in grosser Menge vorhanden, die fest haften bleiben, bis sie abgekratzt werden; ferner klein und weiss gefärbt, glänzend so lange, als sie nicht durch ein äusseres Moment, z. B. Salbe, beschmutzt werden.	sind die Schuppen in geringer Quantität, u. wenn sie zahlreicher sind, so ist ihre Farbe keine weisse, sondern eine schmutziggelbe. — Übrigens verdanken sie ihre Entwicklung ganz andern Abnormitäten (siehe Eczem).	sind die Schuppen auch in geringer Menge vorhanden, und bilden, wie die Ausbreitung d. Lichen selbst, breite Streifen.	ebenfalls in unbedeutender Menge entwickelt, die Haut ist davon nur wie bestäubt u. sie fallen theilweise ab.	ist die Schuppenbildung eine sehr feine, und nur an den Rändern bemerkbar durch Umstülpung der schuppichten Kanten.
Der Grund (auf dem die Efflorescenz sitzt)	ist nicht sehr infiltrirt, und hat man das letzte Stratum der Schuppe weggeschabt, so kommt aus einzelnen Punkten Blut.	ist sehr stark infiltrirt und somit grosse Volumsvermehrung der afficirten Theile. Beim Abkratzen d. Schuppen kein Blut, sondern eine nässende Fläche.	blutet nicht und nässet nicht, u. der Grund ist infiltrirt ohne bedeutende Volumszunahme.	blutet und nässet nicht, und hier fehlt auch die Infiltration.	stellt eine unebene, höckerige und granulirte Oberfläche dar, die gleich anfangs ausgebildet ist.

Die ursprüngliche Bildungsform	Auf einem rothen Punkte erscheinen im Beginne weisse Schüppchen, und weder Bläschen noch Knötchen sind zu sehen.	ist ein Bläschen.	ist hier ein Knötchen, und wenn eine Schuppe darauf liegt, so ist viel Körper und wenig Schuppe.	geschieht gleich anfangs als Schuppe, ist somit in dieser Beziehung der Psoriasis sehr ähnlich.	sind Knoten, die sich an einer Stelle lokalisieren, und sich nicht so sehr ausdehnen, und wenn dies geschieht, so erfolgt Narbenbildung nach der Heilung.
Jucken	Nie ist dies lästige Symptom vorhanden.	ist starkes Jucken der stete Begleiter.	fehlt nie.	fehlt stets.	fehlt stets.
Farbe.	Bei jeder einzelnen Species ist die rothe Färbung eine eigenthümliche, die sich nicht beschreiben lässt.				

Die papulösen Hautausschläge (*Efflor. papulosae*).

Die einzelnen Knötchen können verschiedenartig gefärbt sein, allein die Farbe eines vorhandenen Knötchens bestimmt schon in etwas die Natur desjenigen pathologischen Processes, der dasselbe entstehen liess.

Die Farbe der <i>Papula</i> ist	}	roth, und die Röthe verschwindet beim Fingerdrucke (bedeutet Exsudat); roth, und die Röthe verschwindet nicht beim Fingerdrucke (bedeutet Blutextravasat); weiss, was nur durch Retention des Sebumsecretos erzeugt werden kann; der Haut gleichfärbig, was auf ein seröses Exsudat in dem Follikel zu schliessen berechtigt.
------------------------------------	---	---

Der pathologische Prozess, der zur Bildung des Knötchens beiträgt, kann ein vierfacher sein, und nach der verschiedenen Art dieses Vorganges wird auch die jeweilige Papula durch charakteristische Symptome ausgezeichnet sein.

1. Durch Retention des Sebums, das in normaler oder abnormer Menge secretirt im Follikel zurückbleibt, diesen ausdehnt, und unter der Form eines weissen Knötchens — weil der Inhalt so gefärbt ist — das zwischen zwei Nagelflächen der Finger seitlich gedrückt, den Inhalt entleert. Stehen mehrere derartig gestaltete Knöt-

bei Kindern
heisst der Zustand

Strophulus chronicus.

Str. albidus, sobald diese Knötchen auf weissem Grunde sitzen.

chen neben einander, so bekommt die Haut ein rauhes griesliches Aussehen.

Je nach dem Vorkommen einer solchen Haut

Str. candidus, sobald sie auf rothem Grunde sitzen. (Die-
se Röthe ist als Entzündungs-
röthe um die ertödtete Haut-
drüse zu betrachten, die die
Ausscheidung der Letzteren
bezweckt).

bei Erwach-
senen, so
heisst er

Milium, Grutum.

2. Durch gehinderten Austritt des Haares aus seinem Follikel. In diesem Falle lässt sich die Papula, die aus Epidermis besteht, wegkratzen, und wenn dies geschehen, so findet man unter der-
selben das Haar gekrümmt, oder auch spiralförmig in seinem Austrittskanale sitzen. — An dieser Stelle begegnet das Haar der Epidermis, die seinen freien Ausgang sperrt; dasselbe hebt jedoch in Folge des weiteren Nachwuchses die Epidermis zur Papula hervor. Mehrere solche Knötchen stellen dar: den *Lichen pilaris*.

3. Durch Blutaustritt in den Follikel. In diesem Falle verliert die rothe Papula beim Fingerdrucke ihre Farbe nicht, und das Krankheitsbild gibt uns den *Lichen lividus*, oder *Purpura papulosa*.

4. Durch Exsudatbil-
dung in dem Follikel
(denn nur dann entsteht
eine Papula; geschieht
die Exsudation ausser-
halb des Follikels, so
nimmt d. exsudirte Mas-

a) eine noch mit
Blut farbe-
stoff imprä-
g-
nirte.

a) Bei
Kindern.

Strophulus acutus febrilis. Nach vorausgegangenen,
mehr weniger auffallenden Dentitions - Erschei-
nungen kommen am 2. oder 3. Tage rothe Fle-
cke auf der Haut, auf welchen noch kleinere ge-
sättigtere Punkte sich entwickeln, auf diese Wei-
se zu Knötchen sich gestalten, die 2 — 4 Tage
anhalten und mit Desquamation enden.

se eine gleichmässig vertheilte Form an). Die Knötchen sind in diesem Falle roth gefärbt, und erlassen unter dem Fingerdrucke.

Die im Follikel exsudirte Masse ist:

β) Bei
Erwachsenen.

Lichen (Knötchenflechte, Zitrich). Hier erscheinen rothe Knötchen, die an ihrer Spitze eine kleine Schuppe haben, und nicht wegkratzbar sind. Die Röthe verschwindet beim Fingerdrucke u. macht einer gelblichen Färbung Platz. Heftiges Jucken ist ein nie fehlendes Symptom. — Der Krankheitsprozess besteht hier somit in einer Exsudatbildung.

Nach der Aggregation der einzelnen Knötchen unterscheidet man:

1. *Lichen sparsus* oder *simplex*. Bei welchem die einzelnen Papulae allein stehen und bleiben. Hierher gehören:

Lichen urticatus. Die Knötchen sind gross und sehen aus wie bei *Prurigo*, jedoch roth gefärbt. Vieles Jucken u. Excoriation 2. Grades hat er mit *Prurigo* gemein.

Lichen tropicus, hat Knötchen, die in Folge eines Stiches von Insecten entstehen sollen.

2. *Lichen confertus*, bei dem die alleinstehenden Knötchen durch Vergrösserung d. einzelnen oder Neubil-

tzen werden die Knötchen in Pusteln verwandelt — durch eiteriges Zerfließen — die endlich zu Krusten vertrocknen, unter welchen Geschwürbildung statt findet. — Stets ist auch das Drüsenpaquette am innern oberen Theile des Oberschenkels angeschwollen, das einen Bubo darstellt. Die Haut des pruriginösen Theiles fühlt sich eigenthümlich rau, pergamentartig an.

Man unterscheidet:

NB. *Prurigo pedicularis* oder *Phthyriasis* ist keineswegs eine durch eine eigene Art von Läusen erzeugte Hautkrankheit, sondern das Wesen derselben besteht in Excoriationen, die sich der mit Kleiderläusen (*ped. vestimentorum*) behaftete Kranke durch Kratzen beibringt.

der Knötchen.

hendes Ju-
cken, wobei
durch Kra-
tzen keine
Efflores-
cenz zum
Vorscheine
kömmt.

capituli,
palmae ma-
nus,
plantae pe-
dum, geni-
tium etc.

Prurigo kann mit *Scabies* verwechselt werden, allein sie unterscheiden sich:

Prurigo

a) Im niederen Grade der Ausbildung, denn

1. Hat der Haut gleichfärbige Knötchen, von welchen hie und da nur einzelne eiterig werden.

Scabies

1. Hat geröthete Knötchen, immer theils mit Bläschen, theils mit Pusteln untermischt. Stets ist der Milbengang vorhanden.

b) Im höheren Grade der Ausbildung:	2. Hat gleichmässige Ausbreitung über den ganzen Körper. 3. Zeigt stets die oben geschilderte Anschwellung des Drüsenpaquettes, die Bubonen — deren Entstehen bis jetzt freilich nicht erklärt ist.	2. Die Ausbreitung der Efflorescenzen ist ungleichmässig, denn Brust und Rücken bleiben frei, und werden nur selten, wenn die Krätze lange besteht, befallen. 3. Nie sind die Bubonen vorhanden, die bei Prurigo wieder nie fehlen.
	1. Pusteln, meistens am Unterschenkel, zwischen stark entwickelten Knötchen. 2. Nach Entfernung der Krusten — in Folge der Vertrocknung der Pusteln — nirgends ein Milbengang. 3. Stark entwickelte Bubonen (desto stärker, je heftiger die Krankheit ist).	1. Pusteln sind überall wahrzunehmen, in allen Körpergegenden, wo Krätze vorkömmt (also nur nicht auf der Brust und dem Rücken). 2. Stark entwickelte Milbengänge. 3. Nie Bubonen.

Fünfte Klasse.

Knotige Hautausschläge (*Efflor. Tuberculosae*).

Knoten verdanken ihr Entstehen stets Erkrankungen der Follikel. Wir rechnen indess zu dieser Klasse einzelne Hautkrankheiten, die gleichfalls im Follikel ihren Sitz haben, ohne jedoch die knotige Form anzunehmen, die somit der Vollständigkeit wegen am besten hier abgehandelt werden, da sie zugleich als Entwicklungsstufen gelten, die oft mit Knotenbildung enden. Allein wir werden auch in diese Klasse diejenigen Hautkrankheiten einreihen, die nur der Form nach knotigen Erhabenheiten ähnlich sind. Somit machen wir hier 3 Abtheilungen:

- I. Abtheilung: Erkrankungen der Follikel, die aber nicht unter der Form von Knoten erscheinen.
- II. Abtheilung: Die eigentlichen knotigen Hautkrankheiten.
- III. Abtheilung: Knotenähnliche Hautefflorescenzen.

I. Krankheiten d. Follikel, die jedoch nicht unter der Form von Knoten erscheinen, u. eigentlich Secretions-Anomalien d. Talgdrüsen darstellen.	Seborrhoea besteht in einer vermehrten Talk-Secretion der gleichnamigen Drüsen. Dieser Zustand gibt ein verschiedenes Krankheitsbild, je nachdem das adaugirte Secretum-Secret	a) an die Oberfläche der Haut gelangt, und	α) entweder flüssig bleibt, wodurch die Haut ein öhlig-glänzendes Aussehen bekommt. Beim Wegwischen mit feinem Löschpapier (oder feiner Leinwand) bemerken wir einen öhligigen Fleck auf demselben. β) oder in festen Zustand übergeht (was einem höheren Grade der Krankheitsentwicklung entspricht). In diesem Falle ist das vertrocknete Secretum in Form weisser, schuppenförmiger Körper zu bemerken, die entweder auf normal gefärb-
---	--	--	--

Hierher gehören:
ren:

tem oder auf geröthetem Grunde aufsitzen. In jedem Falle zeigt die darunter gelegene Haut die Mündungen der Talgdrüsen offen und mehr weniger erweitert. Diese Letzteren verpfropfen sich nach einiger Zeit von Neuem, und die Bildung der weissen Schuppen wiederholt sich. Man nennt diesen Zustand:

Acne sebacea, Schmeerfluss, und ist er auf behaarten Theilen, so heisst er *Gneis*, der nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen vorkommt, und zwar am Gesichte. Diese Krankheit ist genau unterschieden vom *Eczem*, weil eine rothe nässende, und vom *Impetigo*, weil man eine eiternde Hautoberfläche bemerkt.

b) oder nicht an d. Oberfläche langt, und zwar: weil die Qualität d. Sebums eine weniger flüssige ist, o. weil Epidermis über d. Mündung des Follikels ausgebreitet ist,

Acne punctata (Comedo).

Erscheint unter der Form schwarzer Punkte, die, wenn sie seitlich gedrückt werden, austreten, und sich als die Spitzen längerer zapfenähnlicher Körperchen darstellen. Dies Letztere ist fest gewordenes Sebum, und ist auch öfters spiralförmig gewunden, in Folge des Drucks,

Der *Tumor folliculi*

sebacei, indem bei schon entwickeltem Comedo die Sebumsecretion in d. Follikel noch fortdauert und zurück gehalten wird — in normaler oder vermehrter Menge — wodurch eine Ausdehnung und somit eine Anschwellung von

oder weil ein dickeres Haar d. freien Aus tritt d. Sebums hindert. — Man kann sich erklären, warum diese Sebumretention vorzüglich in den Pubertätsjahren sich bemerkbar macht, da zu dieser Zeit der Haarschaft umfangsreicher wird. — Diese Sebum-Retention stellt anfangs dar: die

ckes, die ihn aus der weitem Höhlung des Follikels durch dessen engeren Mündung austreibt.

Aus dieser *Acne punctata* kann sich bilden:

verschiedener Grösse entsteht, die in der Haut sitzt, an ihrer Oberfläche einen schwarzen Punkt hat, und beim Drucke von der Peripherie gegen ihr Centrum eine ranzige, übelriechende Flüssigkeit entleert.

Hautsteine: steinharte Körper in der Haut, die dadurch entstanden sind, dass die flüssigen Theile des Inhaltes des *Tum. foll. seb.* resorbirt wurden, u. die Salze zurückblieben.

II. Die eigentlichen knottigen

1. *Acne indurata*, entwickelt sich ebenfalls aus der *Acne punctata*, indem das zurückgehaltene und festgewordene Sebum auf die Um-

α) die *Acne pustulosa*, indem der Inhalt der *Acne indurata* eiterig zerfließt, und somit eine Pustel darstellt, die nicht un-

gebung als fremder Körper zu wirken beginnt, wodurch Entzündung der Follikel-Wandung und Exsudatbildung in demselben statt findet. Somit entsteht Anschwellung und Röthung des Follikels, also das Krankheitsbild: ein rother Knoten, der den Comedo in sich enthält, und nur deshalb nicht sichtbar ist, weil ihn Exsudat einschliesst, oder Epidermis über ihn gelagert ist, bei Anwendung eines stärkeren seitlichen Druckes aber ausgetrieben wird.

Nach ihrer verschiedenen Metamorphose haben wir:

2. *Acne mentagra* (*Sycosis*, Bartfinne), zeichnet sich durch Bildung rother Knoten aus, die von einem Haare durchbohrt sind, und in den behaarten Theilen des Gesichtes ihren Sitz haben. Gruby beobachtete in den aus den Knoten ausgezogenen Haaren eine Mycrodermis, die er als Krankheitsursache ansieht, und sie Mentagraphite nennt.

Man unterscheidet:

mittelbar auf der Haut, sondern auf einem Knoten, wie auf einem Piedestal aufsitzt.

β) oder einzelne harte Knoten, die von kleinen Schüppchen besetzt sind. Diese Form entsteht durch Resorption des Inhaltes unter gleichzeitiger Desquamation des Exsudates. Die Schüppchen der Knoten fallen nach und nach ab, und mit ihrem völligen Ablösen verschwindet der Knoten selbst.

NB. Wenn die *Acne* als *punctata*, *indurata* und *pustulosa* an einem Individuum zu bemerken ist, so heisst sie *Acne disseminata*.

Nach dem Grade der Entwicklung

nur einzelne infiltrirte Follikel, somit auch rothe Knoten in sparser Form neben einander stehend, oder viele, alle neben einander liegende Follikelwerden infiltrirt, dadurch entsteht eine rothe erhabene Fläche — in Folge der Confluenz mehrerer Knoten — die durch ihre Erhöhung und Farbe von

der gesunden Stelle scharf
geschieden ist.

Mit Exfoliation, dann sind
rothe Knoten mit Schup-
pen darauf.

Mit Induration, dann sind
rothe Knoten ohne Schup-
pen.

Mit eiterigem Zerfliessen,
dann sind pustulöse Kno-
ten und Borkenbildung.

In allen diesen Fällen ist jeder einzel-
ne Knoten von einem Haare durch-
bohrt, das wie auf einem Piedestal
aufsitzt.

Nach Art
der Endi-
gung:

3. *Acne rosacea*, Kupferhandel (so benannt, weil mit ihr die *Acne indurata* combinirt ist). — Sie stellt ein verschiedenartiges Bild dar nach dem dreifachen Entwicklungs-
grade:

I. Grad. Teleangiectasie. Gefässenden - Ausdehnung mit stärkerer Injection; die
Capillargefässe an der Hautoberfläche der Nase und des Gesichtes verlaufen geschlängelt.

II. Grad. Er entwickelt sich aus dem ersten, indem, wie bei jeder Gefässausdehnung, so
auch hier, Exsudatbildung in das zunächst gelegene Gewebe eintritt, und somit eine
verdickte geröthete Haut mit darüber gelagerter Teleangiectasie
sichtbar wird. Weil jedoch in der Umgebung der Follikel die meisten Gefässe sind,

so wird auch dort die Infiltration vorherrschend, und die Verdickung der Haut kann keine gleichmässige, sondern eine knotige sein.

III. Grad. Organisation des Exsudates des vorigen Grades; dasselbe wird zur Hautsubstanz mit allen ihren Eigenschaften (Gefässen und Follikeln etc.). Die neugebildeten Gefässe werden immer wieder erweitert, die Infiltration wiederholt sich stets im neuorganisirten Gewebe, und das Krankheitsbild tritt als Hypertrophie der Haut mit darüber gelagerter Teleangiectasie auf. Wiederholt sich dieser Prozess in baumastähnlicher Ausstrahlung, so entstehen knollenartige Anhängsel an der Nase (am Gesichte). Wo Pusteln sichtbar werden an diesen hypertrophisirten Hautstellen, bedeuten selbe ein eiteriges Zerfliessen der neuorganisirten Masse.

4. *Lupus*, Fressende Flechte (*Herpes phagedaenicus*, *Dartre rongeant*, *Radesyge*, *Lepros*, *Scerliero*). Diese knotige Hautefflorescenz erscheint unter verschiedenen Formen, und man unterscheidet:

Lup. maculosus, bei dem im Beginne circumscirbte (linsen- bis erbsengrosse), glatte, härtere (wenn nicht gar harte), rothe, ein wenig in's Bläuliche spielende, über das Niveau der Haut nicht erhabene Stellen bemerkbar sind. — Diese harten Stellen — man nannte sie subcutane Knoten — entstehen durch eine Exsudation, die im Follikel und dessen Wandungen, so wie auch in dessen Umgebung statt findet. — Ausser der Farbenveränderung einzelner Hautstellen ist hier auch die Consistenz eine vermehrte, so- mit die Unterscheidung von Flecken möglich gemacht.

a) Nach der Evolution:

Lup. tuberculosus. Wenn gleich im Beginne harte, roth-gefärbte Knoten wahrzunehmen sind, die somit über das Niveau der Haut hervorragten. — Der Krankheitsprozess ist ganz derselbe,

wie beim maculösen Lupus, nur dass eine bedeutendere Menge von Exsudat in die Haut abgesetzt wurde, das in diesem Falle die Epidermis hebt und den Knoten darstellt.

Lup. exfoliatus, indem das Exsudat der Zwei genannten Lupus-Arten mit Abschuppung endet, so zwar, dass die unter der Epidermis gelagerte Schichte wieder Epidermis wird. In diesem Falle wird das Krankheitsbild, membranöse Schichten über die oben geschilderten harten Stellen oder Knoten darstellen. In Folge der Abblätterung tritt, den krankhaften Stellen entsprechend, Substanzverlust ein, so dass die früheren Erhabenheiten nicht nur abgeflacht werden, sondern auch Vertiefungen zurücklassen können.

Lup. hypertrophicus. Wenn die einzelnen härteren Hautstellen oder Knoten des *L. macul.* und *tuberc.* schon an und für sich, oder durch neue Ablagerung von Exsudatmassen derartig vergrößert werden, dass sie eine bedeutende blauroth-gefärbte Volumvermehrung desjenigen Theiles veranlassen, worauf sie sitzen.

Lup. exulcerans (phagedaenicus, excedens), indem das Exsudat eiterig zerfließt, und ein Zerfallen der organischen Masse deutlich erkennbar ist; dabei sind Eiterpunkte in dem Centrum des Knotens wahrzunehmen. Diese Verjauchung hat die Tendenz, die nahe gelegenen Gewebe — mit Ausnahme der Knochen, die davon frei bleiben — mit in den pathologischen Prozess hineinzu ziehen. — Endlich fließt die fressende Jauche aus, und es ent-

b) Nach der
Form:

stehen durch Vertrocknung Krusten, und unter denselben ist Geschwürbildung (die sehr um sich greift), und da ihnen die Neigung zur Granulation fehlt, so ist die Heilung in Folge bedeutenden Substanzverlustes von Narbenbildung begleitet.

Die genannten Formen kommen jedoch nicht vereinzelt vor bei einem Individuum, sondern vereint, so dass man folgendes Krankheitsbild erhält: Harte, rothe, circumscriptirte Stellen, Knoten ohne und mit darüber gelagerten membranösen Schichten, Eiterpunkte, Krusten und Geschwüre. — Die Benennung entnimmt man aus der praevalirenden Form.

Lup. vulgaris. Anreihung derselben ohne bestimmte Form.

Lup. serpiginosus (Esthiomenos obambulans), wo die Knotenstellung eine halb- oder ganz kreisförmige ist (*orbicularis*), und bei welcher Form die Krankheit am convexen Rande stets weiter schreitet, und am concaven heilt. — Die kreisförmig gestellten Knoten schliessen entweder eine normalbeschaffene Haut ein — wenn sie gleich im Beginne sich in einer Kreisform aggregiren — oder eine narbige Stelle, wenn die Heilung von der Mitte aus anfang, und der krankhafte Prozess in der Peripherie unter vielfach geformten Schlingungen weiter schreitet.

Lup. scrophulosus, der meistens eine blauröthe Färbung zeigt.

Lup. syphiliticus, der braunroth gefärbt ist.

Lup. idiopathicus, der keiner nachweisbaren Dyscrasie sein Entstehen und Fortdauern dankt.

c) Nach der Anreihung (Aggregation) der einzelnen Knoten:

d) Nach dem aetiologischen Momente:

Es wäre somit die Unterscheidung des Lupus in einen:

<i>Lup. vulgaris,</i>	{	maculöse und exfoliative,	{	Alle die genannten können ulceriren.
<i>Lup. serpiginosus,</i>				
Beide können auftreten als:	{	tuberculöse und hypertrophische.	{	

Der Lupus könnte verwechselt werden:

1. Mit scrophulösen Geschwüren, allein es fehlt dann die primäre Form des Lupus — die härteren Stellen und Knoten, — und um die Diagnose zu bestimmen, muss man stets um das erste Auftreten der Hautkrankheit sich bekümmern. Ferner sitzen die scrophulösen Geschwüre in der Haut selbst, die Exulcerationen des Lupus sind über knotige Erhabenheiten ausgedehnt.
2. Mit Hauttuberkeln, allein bei diesen bildet sich ein Follikel zu einem Knoten, welcher aufbricht, und eine käseförmige Masse (Tuberkelstoff) entleert.
3. Mit *Psoriasis inveterata*, allein bei dieser ist nur eine geringe Haut-Infiltration, und sie ist nie so localisirt, und auf kleine Strecken beschränkt, wie der Lupus, und bei Letzterem ist viel weniger Schuppenbildung, aber um desto mehr Hautverdickung.

III. Knoten-
ähnliche
Efflorescen-
zen, die nur
der Form we-
gen den tu-
berkulösen als
Adnexe ange-
reicht werden,
die aber ganz
andern patho-
logischen Pro-
zessen ihr Ent-
stehen danken.

Hierher gehö-
ren:

1. *Moluscum (Mycosis fungoides,*
beerartiger Beerschwamm), stellt
der Haut gleichförmige Knoten dar,
die von der Grösse einer Erbse
bis zu der einer Faust sein kön-
nen, und die entweder mit einer
breiten oder stielförmigen Basis
aufsitzen.

Man unterscheidet nach der
Consistenz:

Mol. contagiosum, bei welchem der geschilderte Kno-
ten mit einer kleinen rundlichen Öffnung in der
Mitte versehen, weich und teigig ist, und beim Sei-
tendrucke einen flüssigen, milchigen Inhalt ent-
leert — den man fälschlich für ansteckend hielt, und
daher die Benennung. — Die Krankheit besteht in
einer Hypertrophie des Talgfollikels, der hiedurch
voluminöser wird, und die Cutis nach Art eines her-
nösen Sackes ausbuchtet. Die Grösse des Letzteren
bestimmt die des Knotens, der gewöhnlich steckna-
delkopf- bis erbsengross ist. — An der Mündung des
Ausführungskanales der Talgdrüse bemerkt man die
Umstülpung der Epidermis, wie sie in den Follikel
eintritt, nebstbei zuweilen das Heraustreten einiger
Acini der hypertrophisirten Drüse. Diese Gestaltung
ähnelte der einer Warze, und ein Molusk könnte dann
leicht für Warze gehalten werden; in diesem Falle
entscheidet der seitliche Druck, — da bei der Warze
nichts entleert wird. —

Mol. non contagiosum. Hier fühlt sich der Knoten fest
an, weil sein Inhalt fest ist, und der Krankheitspro-
zess besteht in Neubildung zellstoffiger, fettiger, fi-
brinöser Gewebe, und stellt die *Steatome*, *Lipome*
und *Fibroide* der Haut dar.

2. *Framboësie (Yaws, pians, Mycosis framboisoides,* himbeerartiger Beerschwamm). Ist
eine in den Tropenländern vorkommende endemische Krankheit. Sie zeigt rothe, erbsen- bis
wallnussgrosse schwammig-weiße Geschwülste, die an ihrer Oberfläche mit kleinen war-

zenförmigen Erhabenheiten besetzt sind, welche Letztere gleichzeitig ein jauchigt-ätzendes Sekret liefern — der Krankheitsprozess besteht in zellstoffartiger Neubildung mit reicher Gefässverzweigung. Bei uns kommt die Krankheit in Folge syphilitischer Dyskrasie vor, und dann heisst sie *Syphilis vegetans framboisoides*.

3. *Keloid* (Knollenkrebs), stellt sich als eine narbige Substanz dar, die zwar der Haut gleichgefärbt, aber durch die in dieselbe eingebetteten Gefässverzweigungen einen roten Anstrich bekömmt. Die krankhafte Stelle wird von den heftigsten Schmerzen durchzuckt. Von einer gewöhnlichen Narbe wird das Keloid unterschieden: durch die heftigen Schmerzen, durch die Gefäss-Ramification und durch die Entstehungsweise, indem das Keloid ohne vorausgegangene mechanische Ursache sich entwickelt.

4. *Elephantiasis*.

a) *Eleph. Graecorum*, die vier Stadien hat:

I. *Stadium inflammatorium*. Auf der Haut des ganzen Körpers entstehen rothlaufartige Entzündungen, die mit Exsudation enden. Dieser pathologische Prozess wiederholt sich oft und erzeugt das:

II. *Stadium hypertrophicum*, indem in Folge der wiederholten Infiltrationen die Haut bedeutend an Volumen zunimmt. Allein es bildet sich eine zweifache Form aus, je nachdem die exsudirte Masse gleichmässig oder ungleichmässig in der Haut vertheilt ist.

a) Nach Alibert, welcher annimmt:

Im ersten Falle wird die Hypertrophie eine gleichmässige, somit auch die Haut und Epidermis eine gleichmässig verdickte sein, die eine braun-gelbbraune Färbung hat — weil auch das Pigment in vermehrter Menge abgelagert ist.

Im zweiten Falle ist die Hypertrophie eine ungleichmässige, somit die Haut drüsig, uneben und knotig.

III. *Stadium ulcerosum*. Die hypertrophirten Stellen werden früher oder später (öfters erst nach Jahren) in jauchende Geschwüre umwandelt, und dieser Erkrankung der äusseren Haut correspondiren Exulcerationen an den Schleimhäuten, besonders des Respirationstraktes, durch welche Adfection die in diesem Zeitraume nie fehlende Stimmlosigkeit erklärbar ist.

IV. *Stadium conclamatum*. Die Erscheinungen des vorigen Stadiums sind intensiver, die Geschwürbildungen ausgedehnter und tiefgreifend, zu denen sich noch hektisches Fieber gesellt, dem der Tod folgt.

β) *Eleph. Arabum (Elephantopus, Pachydermie)*, ist eigentlich eine nur auf einen einzelnen Körpertheil beschränkte *Eleph. Graecorum*, denn sie durchläuft dieselben Stadien mit denselben Erscheinungen, nur mit dem Unterschiede, dass der pathologische Prozess nicht als so bösartig und rapid charakterisirt ist. — Sie localisirt sich gewöhnlich am Unterschenkel, am Ohre, an der Nase, am Scrotum und an den *labiis externis* der weiblichen Genitalien. Stets ist ein bedeutend seröses Exsudat in den hypertrophischen Stellen mit vorhanden, das durch anhaltenden Druck verschwindet — in Folge der Resorption. — Sie ist diejenige Art, die bei uns vorkommt.

α) *Eleph. tuberosa*, die der *Eleph. Graecorum* des Alibert entspricht, und die er für Tuberkel der Haut hält.

β) Nach Daniel-
sen:

β) *Eleph. anaesthetos*, bei welcher an der Haut nichts als Farbveränderung, cachektisches Aussehen und gesteigerte Empfindlichkeit zu bemerken ist, die dann in vollkommene Empfindungslosigkeit und Vertrocknung der Haut übergeht, wozu sich Emaciation und hektisches Fieber gesellt.

Sechste Klasse.

Die Bläschen - Efflorescenzen (*Efflor. vesiculosae*).

Bläschen sind umschriebene erbsen- bis linsengrosse Erhöhungen der Epidermis, die, von einem durchscheinenden Fluidum (als Inhalt) bedingt, mit ihrem grössten Durchmesser auf der Basis aufsitzen.

Das Aussehen der Bläschen-Efflorescenzen kann ein verschiedenes werden, und zwar:

1. In Folge der Veränderung {
a) des Contentums, das {
α) durchscheinend bleibt,
β) oder gelblich gefärbt wird,
γ) oder eiterig zerfliesst (d. h. zur Pustel umwandelt).
b) der Epidermis (als Hülle des Bläschens), die mattweiss wird — in Folge der Imbibition.
2. Durch den Endverlauf des Bläschens selbst, das {
a) berstet, und somit mit Desquamation endet, d. h. mit Entfernung der Hülle (Epidermis). Diese Art der Endigung ist der Bläschen-Metamorphose eigenthümlich, d. h. wenn das Bläschen als solches endet.
b) nicht berstet, wo dann {
α) der Inhalt resorbirt wird, und die Epidermis-Hülle bleibt. i. e. *desquamatio si-liquosa*;

β) der Inhalt vertrocknet, das Bläschen mit Decrustation endet, und die *Crusta lamellosa* darstellt, bei welchem Vorgange dasselbe vorher nicht zur Pustel verändert wurde.

γ) der Inhalt eiterig wird — Verwandlung des Bläschens in eine Pustel — und in Folge dessen Vertrocknung und Borkenbildung eintritt.

Zu dieser Klasse zählt man:

1. *Herpes*, der eine acute, mit Bläschen verlaufende, aber ohne Contagium entstehende Krankheit ist, und bei der eine eigenthümliche Art der Bläschenbildung vorkommt, indem an irgend einer Stelle das Gefühl von Brennen entsteht, das von dem Ausbruche rother Punkte begleitet wird, auf welchem *Stigmata* zum Vorscheine kommen, die sich in Bläschen umwandeln. — Solche Bläschenbildung

a) den normalverlaufenden, der die genannten Eigenschaften besitzt, der aber wieder ist: nach der Localität:

H. labialis

acutus (Hydroa febrilis). Zwei bis drei Bläschen-Gruppen erscheinen auf dem Lippenrande, beschränken sich jedoch nicht auf die *cutis externa*, sondern ziehen auch weiter auf die Schleimhaut der Wange, des weichen Gaumens etc. Das schwache Epithelion berstet jedoch bald, und man sieht dann Excoriationen der Schleimhaut, die man *Ulcera catarrhosa* nennt. — Kommt als kritisches Symptom in Fiebern vor.

chronicus, der ohne Fieber und ohne kritische Bedeutung verläuft, und oft

andere Efflorescenz-Formen voraus. — Diese Bläschen werden um etwas grösser, und enden mit Vertrocknung, also Decrustation, und stellen dann die *Crusta lamellosa* dar. Die Anreihung der Bläschen geschieht gruppenweise, indem neben einer Gruppe eine zweite folgt, und neben dieser wieder eine dritte etc. Die einzelnen Gruppen localisiren sich nur an bestimmten Gegenden, und kommen nie über grosse Flächen ausgedehnt vor. Jede Gruppe befindet sich in einem andern Stadio der Entwicklung. Alle Bläschen einer Gruppe sind in demselben Stadio, d. h. Entwicklungsgrade. Weil alle Bläschen einer Gruppe gleichzeitig ausbrechen und gleichmässig ihren Verlauf durchmachen. — An der Stelle, wo eine Gruppe gewesen, kommt keine zweite während der Gesamtdauer der Krankheit.

{
wiederkehrt, wenn er einmal da gewesen.

H. Zoster, ist jene Form von Bläschen-Ausschlag, der an irgend einem Punkte der Wirbelsäule beginnt, und, die Eine Hälfte des Körpers umfassend, nach vorne an einem tieferen Punkte endet, dabei aber dem Laufe des Nerven, der an der entsprechenden Ursprungsstelle des Rückenmarkes entspringt, folgt. So sehen wir den Zoster folgen:

dem *Accessorio Wilisii*, von den Halswirbeln nach vorne über den Hals;

dem *Nervus Facialis*, vom Ohre über die Eine Gesichtshälfte;

dem Armnervengeflechte über den Ober- und Vorderarm;

den Rippennerven am untern Rande der Rippen;

den Lendennerven über den Bauch;

den Kreuzbeinnerven über den Oberschenkel.

Die Bläschen enden bei diesen Species mit Vertrocknung und Bildung einer *Crusta lamellosa*.

H. praeputialis, kommt vor bei Männern an der Glans, am Praeputium, am Scrotum und auch an dem Rücken des Penis. Bei Weibern an den grossen und kleinen Schamlippen.

Man unterscheidet nach dem Verlaufe:

H. phlyctaenoides. Jeder Herpes, dem alle genannten Eigenschaften nicht zukommen, z. B. wenn nur Eine Gruppe Bläschen sich bildet (währenddem die einzelnen Bläschen übrigens ganz normal verlaufen).

b) den abnorm verlaufenden, der wieder nach der Stellung der Bläschen erscheint:

α) Mit einer bestimmten Form, als:

H. Iris. Gruppenweise Aneinanderreihung der Bläschen, wobei aber Ein vergrössertes Central-Bläschen von einem nicht weit davon entfernten Bläschenkranze umgeben wird. — Diese Form kömmt dadurch zu Stande, dass einige *Vesiculae* insbesondere evolvirt werden, andere hingegen theilweise abortiv zu Grunde gehen, und noch andere confluiren. — Das Centralbläschen ist das stärker evolvirte, der Kranz repräsentirt die Confluirenden, und an der unbesetzten Hautstelle sind einige unentwickelte zu denken. Localisirt sich meistens an den Extremitäten, selten im Gesichte. — Leicht ist die Verwechslung mit *Pemphigus*; allein die sich vorfindende charakteristi-

sche Form, und das isolirte Vorkommen an den Extremitäten befestigen die Diagnose.

H. circinatus. Wo in der Mitte nur rothe Punkte, in der Peripherie der Gruppe jedoch Bläschen sind. Immer entstehen excentrisch neue *Vesiculae*. — Diese Form kömmt durch das abortive Zugrundegehen der Mittelbläschen zu Stande.

β) ohne bestimmte Form:

Species abortivae. Unter den vielen Gruppen zeigt eine vorhergange oder nachfolgende gar keine Bläschen, sondern nur rothe Punkte oder *Papulae*. — Man nennt diese Form dann *Erythema papulatum* oder *tuberculosum*.

Herpes praeputialis kann leicht, seiner Örtlichkeit wegen, mit syphilitischen Affectionen verwechselt werden, weil man versucht und geneigt ist, jede Efflorescenzform an den Genitalien für syphilitisch zu halten. Jedoch

bei *Herpes*

1. entstehen mit vorangehendem starken Brennen viele Bläschen neben und aneinander, die

bei *Syphilis*

1. entsteht meistens ein einzelnes Bläschen, und wenn mehrere, so sind diese von einander entfernt;

2. nie bersten, ausser sie werden gekratzt (weil sie zur *Crusta lamellosa* vertrocknen);

3. wenn sie auch aufgerissen werden, so hat die Wundfläche so viele kreisförmige Abschnitte an der Peripherie zur Begränzung, als vorher Bläschen vorhanden waren;

4. wenn sie nicht aufgerissen werden, so enden sie mit Vertrocknung (Borkenbildung);

5. tritt baldige Heilung ein (in 5—6 Tagen), und wenn auch die Bläschenbildung nachher vom Neuen sich wiederholt, so geschieht dies doch nicht an derselben Stelle, und endlich

6. ergibt die Impfprobe mit dem Secret der Wundfläche keine neue gleichartige Eruption.

Es können übrigens Umstände eintreten, wo die genaueste Vergleichung aller besprochenen Merkmale keine Entscheidung zulassen, sondern ein zeitweises Aufschieben der Diagnose fordern.

2. berstet das Schankerbläschen stets, auch wenn es nicht gekratzt wird — durch Vermehrung des Secrets, das dasselbe entstehen liess — und stellt ein Geschwür dar, bei welchem

3. die Geschwürsfläche eine gleichförmige Begränzung hat — als wäre der betreffende Hauttheil wie ausgefallen. —

4. Bei primär syphilitischen Geschwüren ist nie Borkenbildung — weil bei ihnen viel Secret nachfolgt. —

5. Zeichnen sie sich durch verspätete Heilung aus, so dass eine längere Zeit bis zu ihrem Verschwinden nöthig ist.

6. Ergibt die Impfprobe mit syphilitischem Eiter die Evolution einer gleichartigen *Vesicula*, die endlich auch in ein specifisches Geschwür übergeht.

2. *Exem.* Bei dem eczematösen Prozesse erscheinen Bläschen, die aber nicht immer denselben Anblick gewähren, in Folge ihrer *Metamorphose*, die sie nach längerer oder kürzerer Zeit zu erleiden haben, denn die Bläschen:

- a) bestehen als solche fort, und sind: { α) entweder auf normalem, nicht gerötheten, nicht infiltrirten Grunde sitzend;
 β) oder sie erheben sich auf gerötheter verdickter Basis.
- b) sie werden zerstört: { und man sieht dann tropfenweise wasserhelle Aussickerung auf rothen Punkten. In diesem Falle ist die zarte Epidermishülle gerissen, und das Exsudat tritt unmittelbar an die Oberfläche.
- c) sie werden zur Pustel umwandelt: { indem der Inhalt eiterig wird, also eine secundäre Pustel entsteht. Es können aber gleichzeitig mit den Bläschen primäre Pusteln sich bilden.

Das Eczem wird unterschieden:

- a) Nach der Form:
1. *Ecex. simplex*. Hier sind zusammengedrängte, der Haut gleichgefärbte Bläschen, die ohne Gruppierung und ohne aus andern Efflorescenzen sich herauszubilden (zum Unterschiede von Herpes), eine kleinere oder grössere Strecke der Haut einnehmen, anfangs klein sind und später grösser werden, bis sie endlich bersten, und ihr wasserhelles flüssiges Contentum entleeren — dieser Vorgang bedingt das Nässen, das in dieser Krankheit nie fehlt und worauf Desquamation erfolgt. Diese Erscheinungen wiederholen sich in derselben Ordnung, an derselben Stelle (was beim herpetischen Prozesse nicht geschieht).
 2. *Ecex. rubrum*. Wobei auf einer mehr weniger infiltrirten Hautstelle { kleine wasserhelle, auf rothem Grunde sitzende Bläschen zu sehen sind, deren Hülle eine zarte Epidermis ist, oder rothe Punkte, auf welchen eine freietropfenweise Aussickerung eines wasser-

{ hellen Fluidums statt findet — da hier die zarte Epidermis schon fehlt — weggekratzt wurde. — Diese Species endigt auch mit Abschuppung.

3. *Ecex. impetiginosum*. In so ferne die Bläschen des *Ecexema simplex* und *rubrum* sich mit Pusteln paaren, und in diesem Falle ist, nachdem Bläschen und Pusteln bersten, Aussickerung einer wasserhellen und eiterigen Flüssigkeit sichtbar, so wie auch die Efflorescenz dann mit Desquamation und Decrustation endigt, also mit Schuppen und Krusten.

b) Nach dem Verlauf:

{ *Ecex. acutum*, das universell, d. h. über den ganzen Körper ausgedehnt ist, und als *Ecex. simplex* oder *rubrum* auftritt.

{ *Ecex. chronicum*, das meistens nur ein partielles ist, und an einem oder dem andern Orte sich localisirt.

c) Nach der Localität, d. h. dem Orte, welchen es einnimmt:

{ *Ecex. capilliti*. Kommt meistens als *Ecex. rubrum* oder *impetiginosum* vor, somit ausgezeichnet durch eine geröthete infiltrirte Haut, Aussickern einer farblosen und eiterigen Flüssigkeit, bleibt jedoch nicht auf den behaarten Kopfteil beschränkt, sondern dehnt sich von hier aus auch über die Stirn, den Nacken und die Ohren aus. Dasselbe endigt mit bedeutender Schuppen- und Krustenbildung, und weil am behaarten Kopfe, so ist Verfilzung der Haare durch dazwischen liegende Krusten die Folge. Hieraus entsteht der falsche Weichselzopf (*Trichoma spurium*). — Das Nässen nach Entfernung der Krusten unterscheidet die Krankheit von der *Pityriasis*.

Ecz. auriculorum, kommt ebenfalls meistens als *rubrum* oder *impetiginosum* vor. Die Infiltration setzt sich häufig in den äussern Gehörgang fort, und erzeugt für einige Zeit Schwerhörigkeit, sogar Taubheit (in Folge der Verengerung). Ist die Infiltration hinter den Ohren, dort wo die Ohrmuschel an der Kopfwandung angrenzt, stark, so bilden sich Zerklüftungen, die *Rhagades* darstellen (weil die vertrocknete Masse nicht eben so nachgiebig ist bei Bewegungen des Ohres, als die mehr elastische darunter gelegene Cutis).

Ecz. faciei (*Crusta lactea*, die Vierziger, *Porriigo larvalis*). Kann einzelne Gesichtstheile oder das ganze Gesicht befallen, localisirt sich jedoch am meisten auf beiden Wangen und der Stirne — durch das Nässen hinlänglich von der *Acne sebacea* unterschieden. — Die Infiltration der Haut ist im Gesichte nur gering. —

Ecz. mammarum, hat das Eigenthümliche, dass es sich kreisförmig um die Brustwarze (meistens beider Brüste) entwickelt.

Ecz. umbilici, hat nichts Besonderes.

<i>Ecz. genitalium</i>	{	der Männli- chen	{	Am Penis ist meistens acut verlaufend. Es entstehen eine Unzahl feiner kleiner Bläschen, in deren Folge der Penis selbst bedeutend erysipelatös anschwillt. Der Ausgang ist Desquamation.
------------------------	---	---------------------	---	---

	{	Am Scrotum. Dieses schwillt weniger an, ist jedoch sehr geröthet und fast ganz ex-coriirt, weil die <i>Vesiculae</i> schnell bersten.
--	---	---

Letzterer Umstand veranlasst ein so bedeutendes Nässen, dass im Stehen von dem Scrotum die Flüssigkeit (meistens etwas gelblich) tropfenweise abfällt.

der Weiblichen, das dann am häufigsten an den *labiis externis* sich localisirt. Kommt jedoch selten allein vor, sondern combinirt sich meistens mit eczematösen Prozessen an andern Körpertheilen, oder auch mit der Krätze.

Ecx. perinaei. Beginnt meistens längs der *Rapha*, zuerst mit Jucken ohne Efflorescenz (*Prurigo perinaealis*), dann kommen Bläschen, die durch Kratzen oder von selbst bersten, und das Nässen der kranken Fläche bewirken. — Die Affection dehnt sich über das Scrotum und die übrigen äusseren Geschlechtstheile aus. — Es kommt in Begleitung von Haemorrhoiden, aber auch ohne diese vor. —

Ecx. marginatum. An den Berührungsstellen des Scrotums mit dem Oberschenkel entstehen Bläschen, die sich von hier aus peripherisch über die Geschlechtstheile ausdehnen, und zwar nicht nur von einer Seite zur andern, sondern auch nach rückwärts über das Perinaeum, den innern Theil beider Hinterbacken einnehmend. Diese erkrankte Hautfläche ist kreisförmig begrenzt, in der Mitte braun pigmentirt, an dem Rande entstehen jedoch stets neue Bläschen. — Kommt als *Ecx. rubrum* vor. —

Ecx. an den Beugeseiten der Extremitäten. In der Kniekehle, der Achselgrube, dem Ellbogengelenke (als follicularreiche Stellen).

Ecz. extremitatum, Salzflüsse. Kommt am häufigsten am Unterschenkel, dann am Vorderarme, am Oberschenkel und endlich am Oberarme vor. Die Form einer derartig erkrankten Extremität wird von dem Infiltrationsgrade bestimmt.

1. Grad. Die Cutis hat das Doppelte seines normalen Volums erreicht.
2. Grad. Die Cutis hat das Vierfache seines normalen Volums erreicht, man kann gar nicht mehr die Cutis zur Falte emporheben, weil sie schon zu prall gespannt ist.
3. Grad. Die Dicke der Cutis hat um das Vielfache zugenommen, so dass der Umfang der Extremität bedeutend anwächst und die Krankheit leicht mit *Elephantiasis* und *Ichthyosis* verwechselt werden kann; allein das Nässen und der Mangel der warzenförmigen Oberfläche unterscheiden genau das Eczem.

d) Nach dem aetiologischen Momente:

Ecz. solare, durch directe Einwirkung der Sonnenstrahlen, aber auch durch auf irgend eine Weise erwärmte Luft erzeugt. Durch Kälte entwickelt sich aber auch ein Eczem (möge das Medium welches immer sein).

Bäckerkrätze, ist Eczem an der Hand, entstanden durch Ofenhitze.

Sudamina, durch Wärme und Schweiss erzeugt.

Alle künstlichen Exzeme, durch Einwirkung irgend einer Substanz. Sie haben ein eigenes punktirtes Aussehen, weil jedes Atom an der Haut nur Ein Bläschen hervorruft, somit diese wie Punkte neben einander stehen. Hieher gehören die Exzeme, erzeugt durch

Mercur (*Hydrargyria*);
Kalicausticum, Seife, Wäscherinnenraide;
 Schwefel, Jod, *Sulfas Cupri et Zinci*, *Oleum Crotonis*;
 Alle Bäder (Badeauschlag).

3. *Scabies sarcoptosa*, die Krätze. Diese hat Ein charakteristisches Merkmal, und zwar den Milbengang, d. i. ein Kanal in den einzelnen Straten der Epidermis, der durch ein Thier, die Krätzmilbe (*Acarus scabiei*, *Sarcoptes hominis*), erzeugt wird.

Der Milbengang hat das Aussehen eines durch eine Nadel bewirkten Ritzes, der jedoch nie gerade, sondern meistens geschlängelt verläuft — weil die Milbe von einer Seite des Kanals zur andern sich bewegt — oder auch punktiert erscheint — wenn die Stellen, wo die Milbe an den Seiten der Linie sich eingräbt, hervorstechen. — Die Richtung des Ganges ist sehr verschieden, kann sogar in sich selbst zurückkehren; ebenso differirt dessen Längenausdehnung von 1 Linie bis 4—5 Zoll. Die Färbung ist weiss bei rein gehaltener Haut, oder schmutzig durch äussere Substanzen, die mit dem Gange in Berührung kamen. Diese beigebrachte Färbung verschwindet erst mit der Zerstörung des Ganges selbst. — Der neue Gang ist erhaben und geschlossen, der lange bestehende ist flach und aufgerissen (durch Kratzen). Die Milbengänge kommen vor: an den Händen, und zwar an allen Stellen derselben; am Vorderarme, jedoch selten; an den Füßen, den Plattfuss nicht ausgenommen; am Penis und Scrotum, an der Vorderfläche des Thorax, und manchmal auch am Knie.

Jeder Gang hat zwei Endpunkte:

1. Das Schwanzende, wo die Milbe sich aufhält. Es gibt sich durch eine kolbige Anschwellung zu erkennen, und liegt ausserhalb der Axe der Linie. Dieser Punkt ist entweder lichter gefärbt, wenn keine färbende Substanz mit ihm in Berührung kam, oder dunkler, wenn Letzteres zufällig geschehen, — denn dieser Punkt färbt sich leichter, weil er höher liegt. — Aus diesem Ende kann man die Milben herausfordern. Zu diesem Zwecke sticht man eine Impfnadel horizontal in das Innere des Schwanzendes, und trennt mit der Spitze die Epidermisschichte, die darüber gelagert ist; hat man auf diese Weise die Milbe blossgelegt, so bleibt selbe entweder von selbst an der Nadelspitze hängen — mittelst ihrer langen Haare — oder man muss sie aus der kleinen Vertiefung herausholen.

Mit freiem Auge betrachtet, stellt sich uns die Milbe als ein kleiner, grünlichweisser, rundlicher Körper dar, an dem gute Augen einen noch viel kleineren dunklen Punkt erspähen, den Kopf und die Vorderfüsse des Thieres. Öfters fängt es, auf eine Fläche, besonders auf die Haut, gebracht, also gleich sich zu bewegen oder zu laufen an, und läuft dann, besonders junge Acari, so schnell, dass es in einer Minute einen Weg von $\frac{3}{4}$ Wiener Zoll zurücklegt. Hat man jedoch das Thierchen beim Fangen mit der Spitze der Nadel verletzt, oder tritt sonst ein Umstand ein, der die freie Bewegung desselben hindert, so sieht man blos ein Hin- und Herschwanken, oder es liegt ganz unbeweglich da. Zwischen den zwei Daumennägeln zerdrückt, lässt sich ein ähnliches Geräusch vernehmen, wie bei der Tödtung einer Laus oder eines Flohes.

Unter dem Mikroscope angesehen zeigt sich uns die Milbe als ein einer Schildkröte nicht unähnliches Thier; es besitzt einen beinahe ovalen Körper, ist schwach grünlich gefärbt, am Rücken mit kleinen zackigen Hervorragungen und querverlaufenden, gebogenen, parallelen Streifen versehen, besitzt acht an der Bauchseite angebrachte, in zwiebelähnlichen Scheiden eingeschlossene Füsse, von welchen theils längere, theils kürzere Haare ausgehen, theils und zwar an den vier vordern nebstbei noch an steifen Borsten befestigte Saugnäpfe sich befinden, und endlich einen mit einem kolbigen Saugrüssel versehenen kolbigen Kopf.

Dieses Thier wird jedesmal von einem Krätzkranken übertragen, an demselben Individuum von einer Stelle zur andern, als auch von einem Individuo auf das Andere; denn die Beobachtung weist zerkratzte Milbengänge nach, in welchen keine Milbe mehr zu finden ist, diese muss somit während des Kratzens mittelst der Fingernägel entfernt worden sein, und an diesen haftend, wird sie an eine andere Stelle desselben Körpers, oder auf ein fremdes Individuum (die mit ihm in Berührung kommen) verpflanzt. Auf diese Weise ist die Ansteckungsfähigkeit der Krätze erklärt.

2. Das Kopfende, welches den Anfang des Ganges darstellt, und an diesem befindet sich entweder
- | | |
|---|---------------------------------|
| { | α) eine Efflorescenz, und zwar: |
| | eine papulöse, |
| | oder eine vesiculöse, |
| | oder eine pustulöse, |

- β) es ist keine der genannten Efflorescenzen,
 γ) es sind blos die Residuen einer Efflorescenz vorhanden, indem man einen rothen Fleck sieht, der von einer weissen Kante eingesäumt ist, welche Letztere in die Ränder des furchenartigen Milbenganges einmündet. Die beschriebene Form ist dem Längendurchschnitt eines Destillirkolbens nicht unähnlich, und entsteht dadurch, dass die durch das oberste Epidermidalstratum gebildete Decke des Ganges fehlt. (In Folge heftigen Kratzens bei lange bestehendem Übel.)

Der Verlauf der Krätze ist folgender: Nachdem Jucken durch 4—6 Tage angehalten, bemerkt man — meistens an den Fingern zuerst — den Milbengang, und dann die primäre Efflorescenz dabei, und zwar Bläschen an den Händen und Füßen, und *Papulae* an dem übrigen Körper.

Nun erfolgt ein intensiverer Charakter aller Erscheinungen: das Jucken nimmt zu und folglich auch das Kratzen, die Knötchen werden in Knoten verwandelt, und an diesen entstehen in Folge des Kratzens Excoriationen zweiten Grades — schwarze Krüstchen (die von ausgetretenem und vertrocknetem Blute bedingt werden), während dem die Bläschen entweder zerrissen werden, und an ihrer Stelle erscheint ein rother Fleck (wegen der geringen Anzahl der Epidermisschichten) an der Basis des vorausgegangenen Bläschens, oder sie werden in Pusteln verwandelt. (Die Pustel kommt hier nie primär vor, sondern secundär.)

Endlich erreicht die Krankheit den höchsten Grad, und mit diesem ändern sich auch die Erscheinungen: das Jucken und Kratzen wird sehr heftig, die früheren Krüstchen werden abgekratzt, und an den Knoten bemerkt man dann Geschwüre. Viele Knoten zerfliessen eiterig zu Pusteln, so dass zu dieser Zeit der ganze Körper mit achorösen Pusteln bedeckt ist, und durch Vertrocknung der Letzteren entstehen Borken.

Die gesamten Krätzefflorescenzen sind somit die Folge einer mechanischen Reizung: anfangs durch das Sicheinbohren der Milbe in ihre Gänge, dann durch Kratzen und Reiben der primären Efflorescenzen.

Es ist aber auch leicht einzusehen, dass die Existenz der Krätze nicht aus der Form der Efflorescenzen, sondern einzig und allein aus dem Milbengange zu diagnostisiren ist. So z. B. sehen die bei *Scabies* vorkommenden Knötchen den bei *Lichen*, *Erythema papulatum*, *Prurigo*, *Acne* und beginnenden Blattern sehr ähnlich; so gleichen die Krätzbläschen jenen von *Exczema simplex*, *Herpes*, *Varricella*, einem ausgedehnten Schmeerbalge, und eben so haben die Pusteln von *Ecthyma*, *Exczema impetiginosum* und *Impetigo* ganz dasselbe Aussehen, wie die der *Scabies*.

Siebente Klasse.

Blasen-Efflorescenzen (*Efflor. bullosae*).

Blasen nennt man Erhöhungen der Epidermis, die, durch Erguss eines wasserhellen Fluidums bedingt sind, die Grösse einer Erbse übersteigen und nicht mit ihrem grössten Durchmesser aufsitzen.

Hieher gehören:

Pemphigus

acutus, febris bullosa, Blasenfieber. (Diese Species hat einen typischen Verlauf nach Art der Exantheme.) Nachdem Fieber vorausgegangen, entstehen zuerst im Gesichte, besonders in der Umgebung des Mundes und der Nasenöffnungen, linsengrosse rothe Flecke — die dann auch auf der Brust und dem übrigen Körper zum Vorscheine kommen — welche in ihrer Mitte nach 24 Stunden einen weissen Punkt zeigen — (weil an diesen Stellen schon ein Fluidum angesammelt ist) — die nach den nächsten 24 Stunden schon in Blasen umgewandelt sind — (die dadurch entstehen, dass das früher erwähnte Fluidum in noch grösserer Menge unter der Epidermis ausgeschwitzt wurde). — Die nun entwickelten Blasen bestehen während 4—5 Tagen, vertrocknen dann und bilden Krusten, und mit dem Abfallen der Letzteren hat die Krankheit ihren Verlauf beendet, und neugebildete Epidermis ist zu dieser Zeit an ihrer Stelle schon zu bemerken (diese Krankheit ist eine äusserst seltene).

chronicus oder *Pompholix*, Blasenausschlag. Hat kein Fieber im Beginne, beobachtet keinen typischen, sondern protrahirten Verlauf, aber auch in diesem Falle entwickeln sich linsengrosse rothe Flecke an irgend einer Stelle der Körperoberfläche

(nicht ausschliesslich am Gesichte zuerst), die bald darauf in ihrem Centro einen weissen Punkt bemerken lassen, aus welchem sich die Blase bildet. Diese sind von einem wasserhellen Inhalte derartig gespannt, dass sie platzen (denn die Epidermis vermag der rasch sich vermehrenden Flüssigkeit keinen längern Widerstand zu leisten), der Inhalt fliesst aus, und es bildet sich keine Borke, sondern die zerrissene Epidermis vertrocknet und löst sich ab, während dem an der rothen epidermislosen Stelle die Aussickerung noch fort anhält, und erst nach einiger nicht bestimmbarer Zeit gänzlich aufhört (*pompholix diutinus*). Oder es entstehen neue Blasen, bevor der Prozess in den früher entwickelten beendet ist, und in diesem Falle verliert der Kranke in Folge der oft wiederholten Blasenberstung eine bedeutende Menge bildbaren Stoffes (*Plasma*), was bei längerer Krankheitsdauer Anaemie, hektisches Fieber etc. herbeiführt. — Die Gesamtdauer ist von 3—4 Monaten oder auch so vielen Jahren.

Pemphigus neonatorum (*Paedophlysis bullosa*). Hier bilden sich länglichte Flecke, die in gleichgeformte, ein gelbliches Serum enthaltende Blasen umwandelt werden, und nicht über den ganzen Körper ausgedehnt, sondern nur an einzelnen Stellen (meistens Fusssohle und Gesicht) vorkommen, und am häufigsten cachectische Individuen befallen.

Rupia. Zeigt im Beginne einen rothen linsengrossen Fleck (solche Flecke können auch mehrere getrennt stehend gleichzeitig entstehen), in dessen Mitte die Epidermis bald als weisser Punkt erhoben wird (weiss gefärbt sieht die Epidermis deshalb aus, weil sie von einem unter ihr gelegenen Exsudate macerirt wird), der zu einer mit getrübttem, molkigen Inhalte gefüllten Blase heranwächst (in Folge der Zunahme des Exsudates), die aber nicht, wie beim *Pompholix*, berstet (denn der Ausschwitzungsprozess ist hier kein rascher), sondern der Inhalt coagulirt, vertrocknet und bildet eine Borke, die haften bleibt an der Stelle, wo sie entstanden.

In der Peripherie einer solchen Borke — dort, wo sie von der normalen Haut begrenzt wird — entsteht ein Blasenkreis (in Folge der Ansammlung des noch immer sich erneuernden Exsudates

unter der Borke, welches an der peripherischen Begränzung derselben hervorzutreten sucht, und auf diese Weise die Epidermis kreisförmig erhebt), der wieder zur Kruste vertrocknet. Die Bildung eines Blasenkreises wiederholt sich fort und fort, so zwar, dass der Nächste immer um etwas grösser ist, als der Letzte (denn jeder neue Blasenkreis schliesst doch den früher vertrockneten peripherisch ein), bis endlich als Endresultat des ganzen Prozesses eine konische Borke zum Vorschein kommen muss, die jedoch an ihrer Basis immer wieder von einem Blasenkreise umgeben ist. (Diese konische Borke besteht somit aus mehreren Schichten, von deren jede Untere, als die Jüngere, grösser, weicher und lichter ist, als die Obere. — Die Grösse und der Grad der konischen Entwicklung hängt von der Dauer der Krankheit ab.) — Nach Abfallen der einzelnen Krusten bleibt eine Narbe oder auch eine Erhöhung zurück, welche Letztere der Excavation der Basis der abgefallenen Borken entspricht. — Die Krankheit ist meistens von syphilitischer Dyscrasie bedingt, besonders, wenn sie allgemein verbreitet ist.

Achte Klasse.

Pustulöse Efflorescenzen (*Efflor. pustulosae.*)

Pusteln nennt man Erhöhungen der Epidermis, die mit einem gelben eiterigen Fluidum gefüllt sind.

Man unterscheidet die Pusteln	nach der Entstehung, in	primäre, wenn dieselben ursprünglich als solche auftreten, ohne sich aus einer vorausgegangenen Efflorescenz herauszubilden. Diese primären Pusteln unterscheiden sich von den secundären durch ihr eigenthümliches Aussehen, indem sie unter den gleich zu bestimmenden Formen auftreten, und als solche stets auf der Cutis unter der Epidermis sitzen. (Damit soll nicht behauptet werden, als werde der Eiter unmittelbar aus dem Blute deponirt, sondern dass das gebildete Exsudat äusserst schnell eiterig zerfliesst.)
		secundäre, die sich aus jeder andern Efflorescenz entwickeln kann, in Folge eiteriger Schmelzung.
nach der Form:		1. <i>Achores</i> sind kleine runde, wenig oder gar nicht über das Niveau hervorragende, deutlich von einem Haare (oder <i>Lanugo</i>) durchbohrte Pusteln (was man aus der Depression in ihrer Mitte erkennen kann), die im Follikel sitzen, und deren Fluidum, wenn sie vertrocknen, eine gelbe (honigfärbige) granulirte Borke bilden.

det. — Die Borke besteht aus einer Mischung von Eiter und Sebum.

Die Achores haben entweder einen Hof (*halo*) oder keinen, je nachdem in ihrer Umgebung Entzündungsrothe entwickelt ist oder nicht.

2. *Psydraxion* sind grössere, nicht runde, mit reinem Eiter gefüllte und von einem *halo* umgebene Pusteln, die zu einer grünen Borke vertrocknen, welche nach ihrem Abfallen eine kleine weisse Narbe zurücklassen.

3. *Phlyxakion* sind vollkommen runde, mit eiterigem und blutigem Inhalte gefüllte Blasen, die meistens (wenn auch nicht immer) von einem Halo umgeben sind, und bei ihrem Vertrocknen eine braune Borke bilden. Die braune Färbung ist von dem Blutgehalte abzuleiten.

Hierher gehören:

**1. *Impetigo*
Achor.**

Diese Spezies zeichnet sich durch die Charaktere der achorösen Pusteln aus.

1. Nach der Aggregation der Pusteln, denn:

α) Es bilden sich einzelne, von einander getrennt stehende Achores, wobei der Prozess mit einmaliger Eruption beendigt ist, d. h. es kommt kein Nachschub. In diesem Falle werden kleine Bөрckchen sich bilden, nach deren Abfallen kleine (der Grösse der Krüst-

Allein ihre Form
wird verschieden sein:

chen entsprechende) pigmentirte Flecke zurückbleiben;

β) oder die einzelnen Achores confluiren, und erzeugen eine grössere unebene (granulirte) Kruste, nach deren Abfallen ein grösserer Fleck zurückbleibt. — Dies Zusammenfliessen der Achores wird bedingt von der Schnelligkeit des Prozesses, indem durch die rasch erfolgende Ausschwitzung die Pusteln bersten, wodurch ein eiterig-nässender Grund nach Entfernung der Kruste zum Vorschein kömmt. —

2. Nach der
Dauer der
Krankheit,
denn:

α) Es ist mit einmaliger Prorruption abgethan, dann ist die Kruste nicht sehr dick, und nach dessen Abnahme ist ein trockener pigmentirter Hautfleck zu sehen.

β) Die Prorruption wiederholt sich, und dann wird die schon gebildete Kruste dicker und von dem nachfolgenden Eiter gehören werden, und nach dessen Abnahme wird kein trockener, sondern ein eiterig-nässender Grund zu bemerken sein.

NB. Überall, wo Krusten sich vorfinden, müssen diese gelüftet werden, wenn man eine deutliche Diagnose machen soll, da man nicht nur das Produkt, sondern auch insbesondere die Beschaffenheit des Grundes, auf welchem dasselbe sitzt, zu erforschen hat.

3. Nach dem
Orte, wo
sich die
Achores
localisiren:

a) *Impetigo achor capilliti*. Wenn die
achorösen Pusteln auf dem behaarten Kopftheile
sich localisiren.

α) *Achor granulatus*. Gruppenweise stehende,
von Haaren durchbohrte, achoröse Pusteln;
durch Vertrocknung des Fluidums bilden sich
Krusten, durch fernere Eiterexsudation wer-
den die früheren Krüstchen gehoben, welche
Letztere, da sie die Haare umgeben, diesel-
ben büschelförmig miteinander verkleben,
und wovon einzelne Krüstchen den Haaren
anhaften. Nach Entfernung (Aufweichung)
der Krusten bemerkt man einen eiterig-näs-
senden Grund. Diese Krankheit verbreitet
einen stark ranzigen Geruch — weil viel Se-
bum in den Krusten enthalten ist — und ist
meistens mit dem Bestehen vieler Läuse ver-
gesellschaftet — weil die vernachlässigte
Reinigung ihre Ansammlung begünstigt.

β) *Achor planus (mucosus)*, wobei eine flache
Kruste erscheint, weil die *Achores* eine grö-
sere Parthie oder den ganzen behaarten
Kopf einnehmen, und zu einer gleichmä-
ssigen Borke vertrocknen, in der fast alle
Haare eingebettet sind.

γ) *Achor decalvans*, der kahlmachende Grind. Es entstehen am behaarten Kopfe Pusteln, die nie zusammenfliessen, sondern immer einzeln stehen, von einem Entzündungshofe umgeben und von einem Haare durchbohrt sind (somit im Follikel ihren Sitz haben). Sie vertrocknen, ohne zu bersten, zu kleinen bräunlichen Borken, mit deren Entfernung das Haar auch ausfällt. Derselbe Krankheitsprozess entsteht nun in den Nebenanliegendes. — Das Übel geht von einem oder mehreren Punkten aus, und im letzteren Falle confluiren die Stellen bei längerer Dauer.

Diese Krankheit kann wegen des Aussehens der Haare verwechselt werden:

1. Mit *Favus*, bei dem aber keine eiterige Prorruption als primäre wahrzunehmen ist.
2. Mit *Porriigo decalvans* (auch *Alopecia circumscripta* genannt), bei der jedoch gar keine Efflorescenz, sondern nur ein umschriebenes Ausfallen der Haare bei einer ganz normalen, eher etwas glatten als rauhen Haut bemerkbar ist, und bei der die Haare bald wieder nachwachsen. (Die Ursache soll eine Mycodermis im Haarschafte sein).

2. *Impetigo* *Psydrazion*.

Sind jene Hautproportionen, die den Charakter der psydrasischen Pusteln an sich haben.

Man unterscheidet nach der Entstehungsweise:

b) *Impetigo achor faciei*, der wieder sein kann:

Auf den behaarten Theilen, dann hat er das Ansehen eines *Achor granul.* oder *plan.*, und wird benannt:

nach dem *Achor superciliorum*,

Sitze: *Achor ciliorum*,

Achor barbae { an allen Barthaaren,
an einzelnen do.

Auf den nicht behaarten Theilen, am Gesichte meistens, auf der Nase, an ihrer Spitze, an ihrer äussern und innern Fläche.

c) *Impetigo achor*, an den übrigen Körperteilen.

Primäre, wobei sich die psydr. Pusteln in grosser Menge entwickeln, wovon jede Einzelne einen Hof hat. Wenn aber der Prozess ein rascher und intensiver ist, so können die Halonen zusammenfliessen.

Secundäre: *Impetigo erysipelatodes*, indem die psydr. Pusteln aus einer vorausgegangenen localen Entzündung, aus einem Erysipel sich entwickeln, da das Infiltrat desselben baldigst eiterig schmilzt.

Als eine eigene, in keine der früheren Klassen passende Krankheitsform, ist anzusehen:

Der Favus, Erbgrind, Honigwabengrind. Das Übel besteht in einer pflanzlichen Bildung, und zwar eines Fadenpilzes (einer Myco-dermis), der in dem Haarfollikel zwischen den Zellen der Epidermis gelagert ist, keimt, und sich daselbst fort entwickelt. Er stellt sich als eine blassgelbe, trockene, bröcklichte, Masse dar, die am behaarten Kopftheile sich localisirt, unter der Epidermis im Corion selbst sitzt, einen eigenthümlichen schimmlichten Geruch verbreitet, und von den Haaren vielfach durchbohrt ist.

Es entstehen gelbliche, festweiche, hirsekorn-grosse Körperchen in der Haartasche um ein Haar herum, die sich im weiteren Verlaufe vergrössern. Ein so geschildertes Körperchen nennt man ein Favus-Individuum, und hebt man es aus seinem Bette heraus, so ist dessen äussere Fläche concav, blassgelb (und diese steigt über das Niveau der Haut heraus); dessen innere der Cutis zusehende Fläche ist convex, dunkelgelb gefärbt. — Dort, wo es in der Lederhaut eingebettet war, bleibt nach Entfernung eines solchen Individuums eine stark geröthete, leicht blutende Vertiefung zurück, die der Convexität des Individuums entspricht, und nach einiger Zeit sich wieder ausgleicht.

Man unterscheidet nach der Anzahl und der Aggregation der Favus-Individuen:

Fav. scutellatus, scutiformis. In sofern die Favus-Individuen die ihnen zukommende Form beibehalten, somit das Einzelne, nicht durch die anderen Umgebenden, oder durch Neuentwicklung in der Ausbildung der charakteristischen Form gestört wird.

Fav. vulgaris. In sofern die einzelnen Favi in solcher Menge nebeneinander stehen, dass, wenn sie eine gewisse Ausdehnung erlangen, sie sich gegenseitig mit ihren Kanten berühren und eindrücken, wodurch die oben geschilderte, über einen grösseren oder geringeren Flächentheil ausgedehnte gelbe, bröcklichte Masse zum Vorschein kommt.

In diesem Falle wird man nur an den Begrenzungen ein

gut geformtes Favus - Individuum oder das Segment eines solchen vorfinden.

Unter dem Mikroscope stellt sich jeder einzelne Favus als aus einer doppelten Substanz bestehend dar; nämlich aus einer dunkleren gelben, amorphen, die eine zweite blässergelb gefärbte, aus lauter kleinen Fadenpilzen (Sporen) zusammengesetzte Masse einschliesst.

Die Ursache ist meist Unreinlichkeit, in deren Folge, unter Begünstigung von Ruhe, Wärme und Luft, und einer faulenden gährenden Substanz, diese pflanzliche Bildung (hier wie an allen Orten) sich entwickeln kann. Allein durch Verpflanzung der Sporen wird diese Krankheit ansteckend, und zwar, wenn die Sporen längere Zeit mit der Epidermis in Berührung bleiben, oder wenn man einen schon im Wachsen begriffenen Favus unter die Oberhaut in einen Haarfollikel einbringt.

mit seipre sonit einpreissen können

Kornen der Lippenen Kinnchen mit 20 ganz jeder Kinnchen eine sehr Hautkrankheit entsteht, auch die Abbrüchen sind die quere Abbrüchen Dagegen einseitigen Hautkrankheiten. — Sie setzen sich an

Die Bildung des Favus ist eine sehr seltene Erscheinung, die sich nur bei einer sehr geringen Anzahl von Individuen findet.

Die Syphiliden.

Die Syphiliden sind die durch syphilitische Dyscrasie erzeugten Hautkrankheiten. — Sie treten unter den Formen der früheren Klassen auf, so dass jeder Klasse eine syph. Hautkrankheit entspricht, und wir selbe somit eintheilen können

- I. in: 1. *Syphilis cutanea maculosa.*
2. *Syphilis cutanea squamosa.*
3. *Syphilis cutanea papulosa.*
4. *Syphilis cutanea tuberculosa.*
5. *Syphilis cutanea vesiculosa.*
6. *Syphilis cutanea bullosa.*
7. *Syphilis cutanea pustulosa.*

Diesen adjungiren wir noch:

- II. einzelne Formen, unter welchen die genannte Dyscrasie auch zu erscheinen pflegt.

Um aber die unter irgend einer Gestaltung auftretenden, syphilitischen Hautkrankheiten, von den gleichförmigen, nicht syphilitischen, zu unterscheiden, berücksichtigen wir:

- a) Allgemeine Symptome, d. h. diejenige Reihe von Erscheinungen, die sich ohne Rücksichtnahme auf eine bestimmte Form der Efflorescenz ergeben. Diese sind:

1. Die Färbung, die eine eigenthümliche ist, eine Mischung von Roth mit Braun oder Grau. (Die Schnelligkeit des Exsudativprozesses, und die Dauer der Krankheit, modificiren die Färbung der Prorruption.)
2. Die Form. Sie haben meistens eine runde.

3. Die Ausbreitung. Sie sind gewöhnlich allgemein über den ganzen Körper ausgedehnt, localisiren sich indessen auch auf einzelne Theile. In letzterem Falle prädisponiren sie solche Hautstellen, die den Knochen sehr nahe liegen (somit: den behaarten Kopf, die Stirne, die Gelenken der Jochbeine, des Unterkiefers, des Schlüssel- und Brustbeines, der Schienbeine und der Gelenkenden), und die von der gleichförmigen, nicht syphil. Hautkrankheit seltener eingenommen werden.

4. Die Schuppenbildung ist gering, also dünne Schuppen.

5. Die Krustenbildung ist bedeutend, also dicke Krusten, weil nicht nur die exsudirte Masse, sondern auch die nebenanliegenden Gewebe mit in den Zersetzungsprozess gezogen werden.

6. Das Verhalten gegen Kälte und Wärme. In der Ersteren treten sie zurück, in der Letztern werden sie deutlicher bemerkbar.

7. Bei längerer Dauer bemerkt man einen *habitus cachecticus*, der durch ein eigenthümliches erdfahles Aussehen ausgezeichnet ist.

8. Jucken fast nie, und veranlassen somit kein Kratzen.

b) Eigentliche Symptome, d. h. diejenige Reihe von Erscheinungen, wodurch eine bestimmte Form einer syphilitischen Hautkrankheit von der gleichförmigen, nicht syphilitischen, unterschieden wird. — Diese ergeben sich durch Anwendung der allgemeinen Symptome auf die einzelnen Formen, was wir auch bei jeder einzelnen Art thun werden.

c) Die begleitenden Symptome. Diese sind: die der *lues syphilitica* zukommenden, die syphil. Hautkrankheit begleitenden, vorausgegangenen und nachfolgenden Erscheinungen, die jeder Arzt kennt.

Die syphilitischen Hautkrankheiten sind folgende:

1. <i>Syph. cut. maculosa</i> (<i>exanthematica</i> , <i>Roseola syphilitica</i>),	} entweder mit Resorption des Exsudates und Zurückbleiben pigmentirter Flecke, die
<i>Syphiloketis</i> .	

getrennt stehen und über das Niveau der Haut etwas hervorragten (weil sie durch eine sehr feine Exsudatschichte erzeugt werden, da jede syph. Efflorescenz durch ein Exsudat bedingt wird), über den ganzen Körper verbreitet sind, und können Monate und Jahre bestehen, ohne sich zu ändern, allein die Art der Endigung ist verschieden, und zwar:

den Sommersprossen ähnlich sind;

oder jeder einzelne Flek wird grösser, und in seiner Mitte entsteht eine *Papula*, die zum Tuberkel oder zum pustulösen und ulcerösen Syphilid wird.

2. *Syph. cut. squamosa.* *Syphilolepis.*

Hierher gehört nur die *Psoriasis*, die sich von jeder andern nicht syphilitischen dadurch unterscheidet: dass sie eine eigenthümliche rothe Färbung besitzt, meistens auf der Palmarfläche der Hand und Plantarfläche des Fusses als *Ps. palmaris* und *plantaris* gleichzeitig vorkommt, nur eine geringe Schuppenbildung zeigt und im weiteren Verlaufe zur Ulceration tendirt. — Der Prozess ist hier folgender: An einigen Stellen der flachen Hand bemerkt man Auflockerung der Epidermis, die sich unter der Form weisser Hügeln zu erkennen gibt; wird nun die aufgeloockerte Epidermis (die angehäuften Schüppchen) abgekratzt, so erscheinen die besagten Stellen geröthet (wegen der geringen Anzahl der Epidermis-Schichten), und von einem weissen Epidermidalsaume umgeben. — Dauert die Krankheit längere Zeit, so dass der Substanzverlust (Epidermis-Verlust) bedeutender wird, so wird eine Vertiefung sichtbar. Werden die nachkommenden Schuppen hornartig, so entsteht: *Syphilolepis cornea*.

3. *Syph. cut. papulosa*. Hieher gehört der *Lichen syph.*,
Syphilopsydrax. der nach der Grösse der Knötchen er-
scheint als:

miliaris, bei dem die Knötchen klein sind;
lenticularis, der sich aus dem erstern ent-
wickelt und grössere Knötchen hat.
Beide enden meistens mit Abschup-
pung.

4. *Syph. cut. tuberculosa*. Die einzelnen Knoten sind wie-
Syphilidochthus. der eigenthümlich gefärbt, sind linsen-
bis wallnussgross, ragen über das Ni-
veau der Haut hervor, und sind in des-
sen Gewebe eingebettet. Sie zerfallen
bald und werden geschwürig. Man un-
terscheidet:

Syphilidochthus disseminatus (*Acne indu-
rata*), wenn sie allgemein verbreitet und
ohne bestimmte Anordnung sind.

Syphilidochthus confertus, wenn sie allge-
mein verbreitet, jedoch zu runden For-
men groupirt sind.

Syph. serpiginosus — *Syph. seu Lupus ro-
dens*, wenn sie an einer einzelnen Stelle
sich localisiren und eiterig schmelzen.

Nach der Verbreitung der einzelnen
Knoten und ihrer Aggregation:

5. *Syph. cut. vesiculosa*, *Herpes syphiliticus*. In seltenen Fällen entwickelt sich bei Syphilitischen an
Syphilophlysis. dem obern Theile des Unterschenkels eine Bläschen - Efflorescenz, der man diesen
Namen gegeben.

6. *Syph. cut. bullosa* { *Rupia*,
Syphilopemphyx. } *Pompholia*, } beide sind von livid-rothen Halonen umgeben, bei beiden findet dicke
Krustenbildung statt, und unter derselben ist Geschwürbildung.

7. *Syph. cut. pustulosa*:
Syphilomionthus.

Acne syphilitica oder *Variola syph.* Sie ist der *Acne pustulosa* ähnlich geformt, und unterscheidet sich von derselben durch den schleppenden Verlauf, durch die allgemeine Verbreitung, selbst auch über die Extremitäten (wo die gewöhnliche *Acne* nie vorkommt), durch Krustenbildung mit darunter gelegenen Geschwüren. Sie kann sich primär, und auch secundär, d. h. aus andern Efflorescenzen entwickeln.

Impetigo syphilitica, entwickelt sich aus psydrazischen Pusteln, und endet mit starker Krustenbildung und unterliegenden Geschwüren.

Ecthyma syphiliticum, entwickelt sich aus phlyzatischen Pusteln, die von einem livid-braunen Hofe umgeben sind, und ebenfalls mit starker Krustenbildung enden, unter welchen Geschwürbildung statt findet.

II. Der Syphilis weiters zukommende Formen:

Syph. cut. fungosa, nennt man durch Syphilis bedingte Neubildungen, Wucherungen. Sie bilden Hervorragungen von verschiedener Grösse, Farbe (die von der Anzahl der in ihnen ramificirten Gefässe abhängt). Man benennt sie nach der Form:

- Syphilomykes cauliflora*.
- Syphilomykes crystagalli*.
- Syphilomykes framboisoides*
etc.

Alopecia venerea? *Syphilopsiloma*.

Affectio ungium syphilitica: { *Sicca*, mit einfacher hornartiger Entartung der Nägel;
Syphilonychia. } *exulcerans*, wobei Eiterung an der Begrenzung des Nagels zu bemerken ist, in Folge deren das Nagelblatt gehoben und entfernt wird, und wo nachher an dessen Stelle ein Geschwür zurückbleibt.

Ulcera syphilitica { primäre } Diese sind nicht mit Bestimmtheit von einander zu unterscheiden. Folgende Momente können bei der Diagnose als Leitfaden dienen:

Syphilelecosis. { secundäre }
Primär syph. Geschwüre.
Am ganzen Körper, wo vollkommen gebildete Cutis ist.

Secundär syph. Geschwüre.
Entwickeln sich aus allen syph. Formen.

Geht mehr in die Tiefe.
Vertrocknet stets zu Krusten, und erzeugt nicht so leicht denselben Krankheitsprozess durch Einimpfung.

1. Ort des Vorkommens. An zarten Hautstellen, an den Übergangspunkten der äussern Haut in die Schleimhaut.

2. Entstehungsweise. Aus Knötchen oder Bläschen, oder als primäres Zerfallen der Gewebe.

3. Verlauf. In gleicher Zeit grössere Devastationen machend, als das Secundäre.

4. Ausbreitung. Hat mehr eine Flächenausdehnung.

5. Die Exsudatmasse vertrocknet selten zu Krusten, und erzeugt in den Theilen, mit denen sie in Berührung kommt (durch Einimpfung), ein ähnliches Geschwür.

6. Grund und Rand: soll speckiger und wulstiger sein.

Register.

A.		Pag.			Pag.
Achor.			Crusta lactea		67
— barbae		82	Cyanosis		29
— ciliorum		82	D.		
— decalvans		81	Dermatitis.		
— granulatus		80	— combustionis		22
— mucosus		80	— — bullosa		22
— planus		80	— — erythematosa		22
— supercilior.		82	— — escharotica		22—26
Acne.			— — congelationis		22
— disseminata		49	— — bullosa		22
— indurata		48	— — erythematosa		22
— mentagra		49	— — escharotica		22—26
— punctata		47	Dermatokereas		34
— pustulosa		48	Diphtheritis cutanea		23
— rosacea		50	E.		
— sebacea		47	Ecchymoses		30
— syphilit.		90	Ecthyma.		
Acrodynia		16	— luridum		83
Alopoeia.			— vulgare		83
— circumscripta		82	Eczema.		
— venerea		91	— acutum		66
Anthrax		28	— auriculi		67
B.			— capillitii		66
Bartfinne		49	— chronicum		66
Bäckerkräze		69	— extremitatum		69
Blasenausschlag		74	— faciei		67
Blasenfieber		74	— genitalium		67
Blausucht		29	— impetiginosum		66
C.			— mammarum		67
Clavus		34	— marginatum		68
Cloasma		32	— perinaei		68
Comedo		47	— rubrum		65
			— simplex		65

	Pag.		Pag.
Eczema.		Erythema.	
— solare.	69	— iris	15
— umbilici	67	— laeye	16
Efflorescentiae.		— mamellatum	15
— bullosae	74	— marginatum	15
— maculosae	29	— nodosum	15
— papulosae	40	— papulatum	15
— pustulosae	77	— tuberculosum	15
— squamosae	33	Esthiomenos obambulans	53
— tuberculosae	46	Exanthemata.	
— vesiculosae	59	— proprie sic dicta.	4
Elephantiasis.		— relativa	14
— Arabum	57	Excoriation II. Grad	33
— anaesthetos	58		
— Graecorum	56	F.	
— tuberosa	58	Favus	84
Elephantopus	57	— scutellatus	84
Entzündungsgeschwulst, circum-		— vulgaris	84
scribirte	26	Febris morbillosa sine exanthemate	12
Erysipelas.		— scarlatinosa sine exanthem.	13
— bullosum	25	Framboësie	55
— crustosum	25	Fungus haematodes	32
— erythematosum	21	Furunculus.	
— — ideopath.	21	— purulentus	28
— — symptom.	23	— simplex	27
— fixum	25	— vespajus	27
— gangraenosum	25	Fischschuppenkrankheit	36
— migrans	25	Flechte, die fressende	51
— nervosum	24	Flecke, die	4
— oedematosum	25	— congestions-Flecke	29
— phlegmonosum	26	— Extravasat- —	29
— — ideopat.	26	— Stasen- —	29
— — symptom.	26	Friesel.	20
— pustulosum	25	Frostbeule	22
— putridum	24		
— traumaticum	22	G.	
— venereum	22	Grutum	41
Erythema.			
— afebrile	14	H.	
— annulare	15	Hautcroup	23
— coccygeum	20	Hautentzündung.	
— endemicum	16	— erythematöse	21
— epidemicum	16	— phlegmonöse	26
— exsudativum	14	Hautsteine	48
— febrile	14		
— gyratum	15		
— intertrigo	20		

	Pag.		Pag.
Herpes.		Lichen confertus	42
— acutus	60	— diffusus	43
— circinatus	63	— figuratus	43
— chronicus	60	— gyratus	43
— iris	62	— lividus	41
— labialis	60	— orbicularis	43
— phagedaenicus	51	— simplex	42
— phlyctaenoides	62	— sporsus	42
— praeputialis	61	— tropicus	42
— Zoster	61	— urticatus	42
		Lupus.	
		— excedens	52
		— exfoliativus	52
		— exulcerans	52
Ichthyosis.		— hypertrophicus	52
— cornea	36	— idiopathicus	53
— histrix	36	— maculosus	51
— simplex	36	— orbicularis	53
Ignis sacer.	25	— phagedaenicus	52
Impetigo.		— scrophulosus	53
— achor	78	— serpiginosus	53
— erysipelatodes	78	— syphiliticus	53
— metastatica	83	— tuberculosus	51
— Phlyzakion	83	— vulgaris	53
— Psydrasion	82		
— syphilitica	90		
Intertrigo	33		
		M.	
		Masern	4
		Melasma	32
		— endemicum	32
Keloid	56	— partiale	32
Kleienflechte	35	— universale	32
Knötenflechte	42	Miliaria.	
Knollenkrebs	56	— alba	20
		— arthritica	21
		— epidemica	20
		— idiopathica	20
		— rubra	20
		— symptomat.	21
		— uterina	21
		Milium	41
Leichdorn	34	Moluscum	55
Lentigines.		— contagiosum	55
— ephilides	32	— non „ „	55
— perstantes	32	Morbilli.	
Lepra	51	— abortivi	12
— Willani	36	— confluentes	11
Leucopathia	32		
— universalis	32		
— partialis	32		
Lichen	42		
— circumscriptus	43		

	Pag.
Morbilli.	
— nervosi	12
— nigri	11
— papulosi	11
— putridi	11
— synochales	11
— vesiculosi	11

Morbus.	
— caerulens	29
— Werlhofii	30
Mycosis	55
— fangoides	55
— framboisioid.	55

N.

Naevus vascularis.	
— — flammaeus	31
— — fungosus	31
— — simplex	31
— spilus	32
— verucosus	34
Neolepra Parisiensis	16
Nesseln	19
Nirlus	13

P.

Pachydermie	57
Paedophlysis bullosa	74
Paratrimma	51
— coccygeum	51
Pemphigus	74
— acutus	74
— chronicus	74
— neonatorum	75
Phtyriasis	44
Pians	55
Pitiriasis	35
— amiantacea	35
— furfuracea	35
— nigra	35
— partialis	35
— phthisicorum	35
— rubra	35
— senilis	35
— simplex	35

Pitiriasis universalis	35
— versicolor	35
Poliosis circumsc.	32
Porriigo decalvans.	81
— larvalis	67
Pompholix	74
Prurigo.	
— formicans	43
— latens	43
— mitis	43
— pedicularis	44
— perinaealis	68


Psoriasis.	
— acuta	37
— chronica	37
— circumscripta	37
— diffusa	37
— guttata	36
— localis	37
— lotorum	37
— numularis	36
— orbicularis	37
— palmae manus	37
— pistoria	37
— punctata	36
— universalis	37

Purpura.	
— apoplectica	29
— exanthematica	31
— febrilis simplex	30
— haemorrhagica	30
— idiopathica	29
— papulosa	31
— senilis	30
— simplex	30
— symptomatica	30
— transsudativa	31
— typhosa	29
— urticata	31

R.

Radesyge	51
Rhagades	34
Roseola.	
— aestiva	17

	Pag.		Pag.
Roseola.		Syphilopemphix	89
— annulata	18	Syphilophlysis	90
— autumnalis	17	Syphilopsyloma	91
— cholericæ	18	Syphilopsydrax	89
— rheumatica	18		
— symptomatice	17	T.	
— syphilitica	89		
— typhosa	18	Teleangiectasie	31
— vaccinea	17	Tumor folliculi sebacei	47
— variolosa	17	Tylosis	34
Rothlauf	23		
Rupia	75	U.	
S.		Urticaria.	
		— afebrilis	19
Salzflüsse	69	— alba	19
Scabies sarcoptosa	70	— conferta	19
Scarlatina	5	— ephemera	19
— abortiva	13	— evanida	19
— anginosa	13	— febrilis	19
— gangraenosa	13	— perstans	19
— gastrica	13	— porcellana	19
— miliaris	12	— rubra	19
— nervosa	12		
— septica	12	V.	
— synochalis	12		
— variegata	12	Varicella	11
— vesiculosa	12	Variola	7
Scarlievo	51	— abortiva	13
Scharenfluss	47	— miliaris	13
Schwiele	34	— modificata	10
Seborrhoea	46	— pemphygoides	13
Sprünge	34	— vera	7
Sticksucht	29	Verruca	34
Strophulus.		— acrochordon	34
— albidus	40	— myrmikia	34
— acutus febrilis	41	— sessilis	34
— candidus	41	Vierziger	67
— chronicus	40		
Syphiliden	86	W.	
Syphilodochthus	89		
Syphilelcoses	91	Wäscherinnenraide	70
Syphilojonthus	90	Warze	34
Syphilokelis	87		
Syphilolepis	88	Z.	
Syphilomykes	90		
Syphilonychia	91	Zitrich	42



Schulz, Benedict

Diagnostik der Hautkrankheiten in tabellarischer Ordnung nach Hebra's
Vorlesungen

Wien 1845

Path. 1163 ki

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10474662-5